

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. T
UMUR 30 TAHUN MULTIGRAVIDA DI PMB APPI AMMELIA
KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA

Titin Hardianti¹, Ika Fitria Ayuningtyas²

RINGKASAN

Latar Belakang : Salah satu penyebab faktor tidak langsung kematian ibu dengan jarak kehamilan terlalu jauh atau ≥ 10 tahun yaitu dapat membahayakan ibu dan janin. Salah upaya pemerintah yang dapat menurunkan AKI dan AKB yaitu dengan melakukan *Continuity of care* (COC) mulai dari hamil, bersalin, nifas, neonatus dan pemilihan alat kontrasepsi.

Tujuan : Mampu menerapkan manajemen kebidanan dan asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny. T umur 30 tahun multigravida secara berkesinambungan di PMB Appi Ammelia

Metode : Metode yang digunakan asuhan berkesinambungan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan mengetahui data perkembangan perkembangan secara fisik tertentu atau frekuensi yang terjadinya suatu aspek fenomena sosial termasuk didalamnya adalah interaksi sosial. Jenis penelitian yang dilakukan dalam bentuk studi kasus.

Hasil : hasil dari pendampingan asuhan secara berkesinambungan yang diikuti mulai dari hamil, persalinan, neonatus, nifas sampai memilih alat kontrasepsi masih dalam keadaan normal dan tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktik serta asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan.

Kesimpulan : Asuhan kebidanan berkesinambungan yang telah diberikan mulai dari kehamilan, persalinan, neonatus, sampai memilih alat kontrasepsi sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan.

Kata Kunci: Jarak kehamilan lebih dari 10 tahun

¹Titin Hardianti (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Ika Fitria Ayuningtyas, S.SiT., M.Kes (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**MIDWIFERY CARE CONTINUES IN NY. T AGE 30 YEARS MULTIGRAVID IN
THE AMBELIA APPI PMB
KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA**

Titin Hardianti¹, Ika Fitria Ayuningtyas²

ABSTRAK

Background: One of the indirect causes of maternal death with a pregnancy distance that is too far or ≥ 10 years is that it can endanger the mother and fetus. One of the government's efforts to reduce MMR and IMR is to conduct Continuity of Care (COC) starting from pregnancy, childbirth, postpartum, neonates and the selection of contraceptives.

Purpose: Able to apply midwifery management and midwifery care performed on Ny. T is a 30 year old multigravida continuously at PMB Appi Ammelia

Method: The method used in this continuous care is to use descriptive research methods, namely research methods that aim to find out data on the development of certain physical developments or the frequency with which an aspect of social phenomena including social interaction. This type of research is carried out in the form of case studies.

Results: results from ongoing care assistance followed from pregnancy, childbirth, neonates, childbirth to choosing contraception are still in a normal state and there is no gap between theory and practice and the care provided is in accordance with midwifery care standards.

Conclusion: Continuous midwifery care that has been given ranging from pregnancy, childbirth, neonates, to choosing contraception is in accordance with the standards of midwifery care.

Keywords: Pregnancy distance more than 10 years

¹Titin Hardianti (D-3) Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta

²Ika Fitria Ayuningtyas, S.SiT., M.Kes (D-3) Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta