

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. D UMUR 25
TAHUN MULTIPARA DI PUSKESMAS GODEAN II SLEMAN
YOGYAKARTA**

Venisiska Dahlia¹ Ratna Prahesti²

RINGKASAN

Latar Belakang: Penyebab langsung AKI di Indonesia meliputi pendarahan, eklamsi, abortus, infeksi, partus lama dan penyebab lainnya. Upaya penurunan AKI dilakukan dengan memberikan asuhan berkesinambungan (*Continuity of Care*) dimulai dari kehamilan, bersalin, nifas, dan BBL

Tujuan: Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny.D umur 25 tahun dari kehamilan, bersalin, nifas, dan BBL

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah studi penelaahan kasus

Hasil: Asuhan kebidanan diberikan kepada Ny.D berlangsung dari kehamilan 36⁺² minggu, dengan frekuensi kunjungan hamil 2 kali, pada kunjungan pertama ibu mengalami anemia ringan, penulis telah melakukan penatalaksanaan sesuai dengan teori sehingga masalah teratasi. Persalinan berlangsung normal di rumah sakit dengan kala I fase aktif memenjang 24 jam, kala II 30 menit, kala III 5 menit, kala IV 2 jam. Tanggal 17 Februari 2018 pukul 19.30 WIB bayi lahir normal langsung menangis, tonus otot baik, kulit kemerahan BBL 3070 gram, PB 48 cm. Kunjungan neonatus dilakukan 3 kali tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan fakta. Kunjungan nifas sebanyak 3 kali, kunjungan pertama ibu mengeluh ASI kurang lancar, penulis memberikan KIE perawatan payudara agar ASI lancar keluhan teratasi.

Kesimpulan: Telah dilakukan asuhan kebidanan berkesinambungan dari hamil, bersalin, nifas, dan BBL.

Kata Kunci: Asuhan berkesinambungan

¹ Mahasiswa Program Studi Kebidanan (D3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Pembimbing Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta