

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ruptur perineum berdasarkan umur ibu yang melahirkan spontan di BPM Wayan Witri Sleman Yogyakarta sebagian besar berumur 20-35 tahun sebanyak 33 responden (80,5%).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ruptur perineum berdasarkan berat badan bayi yang lahir spontan di BPM Wayan Witri Sleman Yogyakarta sebagian besar dengan berat badan 2500-4000 gram sebanyak 38 responden (92,7%).
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ruptur perineum berdasarkan jarak kelahiran yang melahirkan spontan di BPM Wayan Witri Sleman Yogyakarta sebagian besar dengan jarak kelahiran < 2 tahun sebanyak 20 responden (48,8%).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ruptur perineum berdasarkan paritas ibu yang melahirkan spontan di BPM Wayan Witri Sleman Yogyakarta sebagian besar multipara sebanyak 31 responden (75,6%).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses pembelajaran dan menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Bagi Bidan Wayan Witri

Dengan adanya penelitian ini tenaga kesehatan dapat meminimalisir terjadinya ruptur perineum pada persalinan normal.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengalaman bagi peneliti untuk mengatasi risiko terjadinya ruptur perineum.