

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase responden terbanyak dalam penelitian ini adalah wanita yang menggunakan kontrasepsi pil kombinasi sebanyak 15 responden (41,7%) dan responden terendah yang menggunakan kontrasepsi suntik 1 bulan sebanyak 3 responden (5,6%).
2. Persentase penderita kanker payudara dilihat penggunaan kontrasepsi pil di RSUD Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 15 responden (41,7%).
3. Persentase penderita kanker payudara dilihat penggunaan kontrasepsi suntik 1 bulan di RSUD Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 3 responden (8,3%).
4. Persentase penderita kanker payudara dilihat penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan di RSUD Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 12 responden (33,3%).
5. Persentase penderita kanker payudara dilihat penggunaan kontrasepsi implant di RSUD Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 6 responden (16,7%).

B. SARAN

1. Bagi Institusi Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi dan bahan bacaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya bagi mahasiswa (D3) Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

2. Bagi RSUD Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan deteksi dini kanker payudara dengan cara SADARI untuk mendeteksi dini ca mammae.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab kejadian kanker payudara dengan variabel yang berbeda, misalnya seperti usia paritas, genetik berat badan, usia menarche dengan jumlah responden yang lebih banyak dan tempat yang berbeda.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA