

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hubungan interaksi obat antihipertensi dengan luaran klinis pada pasien preeklampsia rawat inap di RSUD Bantul pada periode Januari-Mei tahun 2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik pasien preeklampsia mayoritas berusia 26-35 tahun dengan usia kehamilan 28-41 minggu (trimester ke-3). Pasien mengalami derajat preeklampsia berat serta pasien dengan status kehamilan pertama.
2. Karakteristik obat antihipertensi pada pasien preeklampsia didominasi oleh metildopa, nifedipin dan amlodipin dengan golongan antihipertensi yaitu *Calcium Channel Blocker* dan *Agonis Receptor Alfa-2 Adrenergik*.
3. Tidak terdapat hubungan antara interaksi obat antihipertensi dengan ketercapaian target luaran klinis dengan nilai $p\ value=0,828$.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat interaksi obat antihipertensi dan luaran klinis secara aktual atau prospektif.
2. Analisis interaksi obat antihipertensi pada preeklampsia dapat dihubungkan dengan luaran klinis lainnya seperti nilai pemeriksaan objektif spesifik pada pasien preeklampsia
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji efek samping potensial maupun aktual pada penggunaan obat antihipertensi pada pasien preeklampsia dan hubungannya terhadap luaran klinis.