

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Profil penggunaan obat antidiabetes pada pasien DMG di antaranya:
 - a. Berdasarkan jumlah obat yang terdiri atas obat tunggal (80,00%) dan obat kombinasi (20,00%).
 - b. Berdasarkan golongan obat terdiri atas golongan insulin (70,27%), golongan biguanid (27,03%), dan golongan sulfonilurea (2,70%).
 - c. Berdasarkan jenis obat terdiri atas insulin aspart (43,24%), insulin detemir (16,22%), insulin novomix (10,81%), metformin (27,03%), dan glimepirid (2,70%).
2. Analisis rasionalitas penggunaan obat antidiabetes pada pasien DMG di antaranya tepat pasien (100%), tepat indikasi (100%), tepat obat (89,19%), dan tepat dosis (64,86%).

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diperlukan pengembangan terkait analisis penggunaan obat antidiabetes dengan kategori rasionalitas yang lebih lengkap.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis hubungan antara rasionalitas penggunaan obat dengan *outcome clinic*.
3. Bagi Rumah Sakit diharapkan dapat meningkatkan pemantauan terhadap kelengkapan data rekam medis pasien sehingga akan mempermudah dalam mengetahui riwayat penyakit dan riwayat pengobatan pasien.