

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil asuhan keperawatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Ny. P, dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengkajian pada pasien Ny. P P2 A2 *post partum* didapatkan masalah produksi ASI baru keluar sedikit.
2. Diagnosa keperawatan yang didapatkan Ny. P yaitu menyusui tidak efektif.
3. Intervensi keperawatan yang ditentukan oleh peneliti yaitu edukasi menyusui (I.12393).
4. Implementasi yang dilakukan pada Ny. P berupa Pijat *Oksitosin* selama 1 kali setiap shift selama 3 hari.
5. Hasil evaluasi keperawatan pada diagnosa keperawatan menyusui tidak efektif teratasi.

#### **B. Saran**

##### 1. Bagi Pasien

Diharapkan pasien dan keluarga pasien mampu menerapkan intervensi pijat *oksitosin* secara mandiri untuk kelancaran produksi ASInya.

##### 2. Bagi Perawat atau Bidan

Diharapkan dapat menerapkan pijat *oksitosin* sebagai intervensi keperawatan mandiri dalam asuhan keperawatan pada pasien *post partum* spontan yang mengalami kendala ketidaklancaran produksi ASI.

##### 3. Bagi Institusi Pendidikan dan Ilmu Keperawatan

Diharapkan dapat menjadi Asuhan Keperawatan ini sebagai bahan untuk mengembangkan teori dan penerapan pijat *oksitosin* terhadap pengeluaran ASI pada ibu *post partum* spontan.

##### 4. Bagi Mahasiswa Keperawatan

Diharapkan mampu meningkatkan atau membuka wawasan dan keterampilan dasar untuk memperbarui ilmu tentang proses keperawatan

dan teori yang ada dengan yang nyata yang terjadi di lapangan saat melakukan praktik kerja keperawatan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA