

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY.A UMUR 33 TAHUN MULTIGRAVIDA DI PMB DIAN HERAWATI WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

Riska Agnesvatista¹, Tyasning Yuni Astuti Anggraini²

RINGKASAN

Latar Belakang: Anemia atau kekurangan zat besi menjadi salah satu faktor penyebab kematian ibu hamil. Ny. A dengan Hb 10,3 gr% dapat menyebabkan BBLR, perdarahan pada saat persalinan dan dapat berujung pada kematian ibu. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan asuhan berkesinambungan (*Continuity Of Care*) mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan pelayanan KB.

Tujuan: Memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny.A umur 33 tahun multigravida di PMB Dian Herawati Yogyakarta.

Metode: Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Dan jenis penelitian dalam bentuk study kasus.

Hasil: Asuhan Kehamilan pada Ny. A dilakukan 1 kali pada saat usia kehamilan 39 Minggu. Tidak ada keluhan, Hb 10,3 gr%, diberikan KIE Nutrisi dan suplemen zat besi, persalinan dilakukan secara normal, tidak terdapat masalah. Bayi lahir normal (3600gram), Neonatus dilakukan sampai KN 3, pada saat KN 3 bayi diberikan pijat bayi. Nifas dilakukan sampai KF 4, pada KF 4, pada KF 2 ASI sudah keluar, dan saat KF 3 pasien diberikan pijat Oksitosin dilakukan 4 kali, 1 kali di PMB Erni kumala dewi dan 3 kali dirumah pasien dengan memberikan asuhan komplementer pijat oksitosin. Kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali dirumah pasien dengan memberikan asuhan komplementer pijat bayi.

Kesimpulan : Asuhan kebidanan secara berkesinambungan dari hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sudah dilakukan sesuai standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Asuhan berkesinambungan, Multigravida, Kebidanan.

¹ Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta