

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. A UMUR 20 TAHUN PRIMIGRAVIDA DI PMB SULARSI GUNUNGKIDUL

Diana Ida Wijayanti¹. Dwi Yulinda²

RINGKASAN

Latar Belakang: Nyeri pinggang bawah (*low back pain*), biasanya terjadi antara 4-8 bulan usia kehamilan. Nyeri biasanya terasa dipinggang bagian bawah, terkadang menyebar kebokong dan paha, dan kadang turun ke kaki. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan sebagai penyebab tertinggi dari kematian ibu, hal ini dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan melalui *Antenatal Care* (ANC) secara teratur. Dalam meningkatkan pelayanan tersebut terdapat penentu kelangsungan dan kualitas Kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan *Continuity Of Care* (COC) yang dimulai dari masa hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.

Tujuan: Menerapkan asuhan kebidanan sesuai standar pelayanan kebidanan yang diberikan pada Ny. A umur 20 tahun primigravida di PMB Sularsi Gunungkidul.

Metode: Jenis penulisan dengan studi kasus dilakukan melalui pendampingan asuhan kebidanan komprehensif *Continuity Of Care* (COC) dengan memberikan asuhan berkesinambungan, dengan metode penulisan kualitatif yaitu suatu prosedur penulisan menggunakan data deskripsi berupa tulisan lisan serta pengamatan pada subjek penulisan, bertujuan untuk mengetahui perkembangan Kesehatan ibu dan bayi.

Hasil: Asuhan yang diberikan kepada ibu selama dan setelah kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir masih dalam keadaan normal ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktik,

Kesimpulan: Asuhan kebidanan berkesinambungan (*Continuity Of Care/COC*) pada Ny. A diberikan selama dan setelah kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Faktor resiko kehamilan

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta