

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA  
NY. A UMUR 39 TAHUN MULTIPARA DI PMB  
SUPRIYATI BERBAH SLEMAN**

Yunita sari<sup>1</sup>, Nur Rahmawati Sholihah<sup>2</sup>

**INTISARI**

**Latar Belakang:** Faktor penyebab tidak langsung kematian ibu yaitu empat terlalu salah satunya adalah hamil usia  $\geq 35$  tahun. Upaya pemerintah yang dapat menurunkan AKI dan AKB yaitu dengan melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan mulai dari hamil, bersalin, nifas, dan neonatus. Yang bertujuan untuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya komplikasi yang menyertai ibu dan bayi.

**Tujuan:** Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny. A umur 39 tahun multigravida di PMB Supriyati Berbah Sleman Yogyakarta

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, jenis penelitian studi kasus.

**Hasil:** Asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny. A dari K1 sampai K4 ditemukan bahwa ibu mengalami ketidaknyamanan nyeri punggung pada UK 35<sup>+1</sup> minggu dan kram pada kaki pada UK 38<sup>+1</sup> minggu, diberikan asuhan KIE ketidaknyamanan. Pada saat INC Kala I berlangsung selama 14 jam, kala II 40 menit, kala III 7 menit, kala IV 2 jam. Pada persalinan kala I diberikan terapi komplementer massage *Counterpressure*. Pada masa nifas diberikan komplementer pijat oksitosin. Pada neonatus diberikan komplementer pijat bayi.

**Kesimpulan:** Asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny. A umur 39 tahun multipara dengan penambahan komplementer *Message Counterpressure*, pijat oksitosin dan pijat bayi sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

**Kata Kunci:** **Asuhan Berkesinambungan, Kebidanan, Usia Hamil  $\geq 35$  Tahun**

---

<sup>1</sup>yunita Sari Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Nur Rahmawati Sholihah, S.ST.,M.Keb (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ASUHAN SUSTAINABLE MIDWIFERY IN  
NY. A 39 YEARS OLD MULTIPARA AT PMB  
SUPRIYATI BERBAH SLEMAN**

Yunita Sari<sup>1</sup>, Nur Rahmawati Sholihah<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

**Background:** The indirect causes of maternal death are four too, one of which is pregnancy  $\geq 35$  years of age. The government's efforts to reduce MMR and IMR is by providing continuous midwifery care starting from pregnancy, childbirth, postpartum and neonates. Which aims to detect early possible complications that accompany mother and baby.

**Purpose:** Providing continuous care for Mrs. A, 39 years old, multigravida at PMB Supriyati Berbah Sleman Yogyakarta.

**Methods:** The research method used is descriptive method, type of case study research.

**Result:** The midwifery care carried out on Mrs. A from K1 to K4 it was found that the mother experienced back pain discomfort at UK 35<sup>+1</sup> week and leg cramps at UK 38<sup>+1</sup> week, given KIE discomfort care. When INC stage I lasted for 14 hours, stage II 40 minutes, stage III 7 minutes, stage IV 2 hours. In the first stage of labor, complementary massage therapy is given *Counterpressure*. During the postpartum period, complementary oxytocin massage is given. Neonates are given complementary infant massage.

**Conclusion:** Continuous midwifery care for Mrs. A 39 years old multiparous with the addition of complementary *Message Counterpressure*, oxytocin massage and infant massage in accordance with the standard of midwifery services.

**Keywords:** Continuous Care, Midwifery, Pregnant Age  $\geq 35$  Years

<sup>1</sup>yunita Sari Midwifery (D-3) Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta

<sup>2</sup> Nur Rahmawati Sholihah, S.ST., M.Keb (D-3) Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta