

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. R UMUR 29
TAHUN MULTIPARA DI KLINIK KEDATON PLERET
BANTUL YOGYAKARTA**

Norohimah¹, Budi Rahayu²

RINGKASAN

Latar belakang : Salah satu faktor resiko kehamilan yaitu jarak persalinan terakhir 10 tahun yang lalu dimana pada kehamilan ini seolah-olah seperti menghadapi kehamilan/persalinan yang pertama. Selain jarak kehamilan yang terlalu jauh faktor resiko kehamilan lainnya yaitu Anemia yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kematian ibu. Upaya yang dilakukan untuk jarak persalinan terakhir 10 tahun yang lalu yaitu dengan melakukan deteksi dini dengan cara skoring (skrining/deteksi ibu risiko tinggi) dan pemberian jus jambu biji. Salah upaya pemerintah yang dapat menurunkan AKI dan AKB yaitu dengan melakukan asuhan secara berkelanjutan atau Continuity of care (COC) yang dilakukan sejak mulai sejak prakonsepsi, kehamilan, persalinan hingga 6 minggu post partum untuk menghindari terjadinya komplikasi pada masa kehamilan hingga pasca melahirkan.

Tujuan : Mampu melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny. R umur 29 tahun Multipara di Klinik Kedaton Pleret, Bantul Yogyakarta

Metode : Metode yang digunakan dalam asuhan komprehensif ini adalah metode penelitian deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah studi penelaahan kasus

Hasil : Pengkajian dilakukan dengan membandingkan asuhan yang telah dilakukan sesuai dengan teori dan hasil dari asuhan tersebut

Kesimpulan : Tidak terdapat kesenjangan antara teori maupun kasus yang telah terjadi, hal ini dibuktikan dengan pengkajian antara asuhan yang telah dilakukan sesuai dengan teori dan hasil dari asuhan tersebut

Kata Kunci : jarak persalinan 10 tahun yang lalu, anemia dalam kehamilan

¹ Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. R UMUR 29
TAHUN MULTIPARA DI KLINIK KEDATON PLERET
BANTUL YOGYAKARTA**

Norohimah¹, Budi Rahayu²

ABSTRACT

Background: *One of the risk factors for pregnancy is the distance between the last delivery 10 years ago where in this pregnancy seemed as if to face first pregnancy /childbirth. Besides the pregnancy distance is too far a factor Another risk of pregnancy is anemia, which is a contributing factor the occurrence of maternal death. Attempts made to last 10 labor distances years ago, namely by conducting early detection by means of scoring (screening / detection of high risk mothers) and administration of guava juice. Wrong attempt the government that can reduce MMR and IMR is by doing sustainable continuously or Continuity of care (COC) since its inception since preconception, pregnancy, childbirth up to 6 weeks post partum for avoid complications during pregnancy to postpartum.*

Objective : *Able to provide continuous midwifery care for Mrs. R 29 years old Multipara at the Pleret Kedaton Clinic, Bantul Yogyakarta*

Method: *The method used in this comprehensive care is method descriptive research, the type of research used is a case study*

Result: *The assessment was carried out by comparing the care that had been done in accordance with the theory and results of the care*

Conclusion: *There is no gap between theory and existing cases happens, this is evidenced by the assessment between the care that has been done in accordance with the theory and results of the care*

Keywords: *Delivery interval 10 years ago, anemia in pregnancy*

¹ *Midwifery Student (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta*

² *Midwifery Lecturer (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta*