

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY.A UMUR 38 TAHUN MULTIGRAVIDA DI KLINIK KEDATON BANTUL

Dewi Gita Cahyani¹, Elvika Fit Ary Shanti²

RINGKASAN

Latar Belakang: Ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun dapat menyebabkan preeklamsi, anemia persalinan macet pada ibu dan dapat menyebabkan berat lahir rendah pada bayi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan asuhan berkesinambungan mulai dari kehamilan, bersalin, nifas dan BBL.

Tujuan: Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny.A umur 38 tahun multigravida di Klinik Kedaton Bantul

Metode: Metode penelitian jenis deskriptif, jenis penelitian studi kasus

Hasil: Asuhan kehamilan pada Ny.A dimulai dari UK 35 minggu, UK 36⁺¹ minggu - 37⁺² minggu, K1: UK 35 minggu, tidak ada keluhan, diberikan konseling nutrisi dan ketidaknyamanan pada ibu hamil, K2: UK 36⁺¹ tidak ada keluhan dan diberikan KIE kebutuhan nutrisi, diberikan konseling P4K, K3: 37⁺² minggu, diberikan KIE tanda-tanda persalinan. Persalinan berlangsung secara normal, pada usia kehamilan 39 minggu. Bayi lahir normal (3200 gram), asuhan yang diberikan sebanyak tiga kali, KN 1: dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi, KN 2 diberikan konseling pemberian ASI eksklusif, KN 3: dilakukan asuhan komplementer pijat bayi. KF 1: tidak ada keluhan dan diberikan konseling tentang perawatan perineum, KF 2: pengeluaran ASI kurang lancar dan diberikan asuhan komplementer pijat oksitosin, KF 3: ibu mengatakan tidak ada keluhan dan diberikan konseling tentang keluarga berencana jangka panjang.

Kesimpulan: Asuhan kebidanan pada Ny.A berjalan lancar mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi secara keseluruhan dalam keadaan normal. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Asuhan Berkesinambungan, Multigravida, Kebidanan

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta