

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. V UMUR 25
TAHUN PRIMIPARA DI KLINIK PRATAMA WIDURI SLEMAN
YOGYAKARTA**

Bella Tarmizi¹, Elvika Fit Ari Shanti²

INTISARI

Latar Belakang : Kehamilan dengan Letak sungsang adalah dimana letak janin memanjang dengan bagian terendahnya bokong, kaki atau kombinasi keduanya. Persalinan dengan letak sungsang dapat menimbulkan dampak seperti robekan perineum lebih besar, jika Ketuban Pecah Dini (KPD) dapat terjadi partus lama dan infeksi.

Tujuan : Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny. “V” umur 25 tahun primipara di Klinik Pratama Widuri Sleman Yogyakarta.

Metode : Metode laporan deskriptif, jenis metode studi kasus, desain laporan *Continuity Of Care*.

Hasil : Asuhan Kehamilan pada Ny. “V” dimulai dari umur kehamilan 35 minggu 5 hari sampai usia kehamilan 40 minggu, K1: UK 35+5 minggu melakukan USG untuk memastikan apakah masih sungsang atau tidak, K2: UK 37+2 dengan anemia ringan dan diberikan komplementer jus jambu biji, K3: UK 38+4 minggu dalam keadaan normal dan evaluasi anemia, K4: UK 39 minggu dengan nyeri punggung, diberikan KIE penanganan nyeri punggung. Pada tanggal 18 April 2020 Ny. V melahirkan secara normal, ibu mengatakan ASI belum keluar. Asuhan yang diberikan yaitu perawatan payudara dan KIE pijat oksitosin. Setelah dilakukan asuhan ASI keluar lancar.

Kesimpulan : Asuhan kebidanan berkesinambungan yang telah diberikan kepada Ny. V sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, dan asuhan komplementer yang diberikan kepada Ny. V dapat mengurangi keluhan ibu dan memenuhi kebutuhan ibu.

Kata kunci : asuhan berkesinambungan, primipara kebidanan

¹Bella Tarmizi (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Elvika Fit Ari Shanti (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. V UMUR 25
TAHUN PRIMIPARA DI KLINIK PRATAMA WIDURI SLEMAN
YOGYAKARTA**

Bella Tarmizi1, Elvika Fit Ari Shanti

ABSTRACT

Background: A breech pregnancy is the location of the fetus elongated with the lowest part of the buttock, legs or a combination of both. Labour with breech location have an impact such as a larger perineal tear, if the rupture of membranes (KPD) can result in prolonged labour and infection.

Objective: Gives continuous of care to Mrs. "V" age 25 years old primipara at widuri pratama clinic of sleman Yogyakarta.

Method: The method is descriptive, the kind of case study, design report Continuity Of Care.

Results: Pregnancy care of Mrs. "V" star from 35 weeks 5 days until 40 weeks of gestation, K1: UK 35+5 week does an ultrasound to know the whether it's still breech or not, K2: UK 37+2 with mild anemia and given complementary of guava juice, K3: UK 38+4 week under normal conditions and evaluation for anemia, K4: UK 39 week with Back pain, given (KIE) handling for back pain.

Conclusion: Continuous midwifery care that has been given to Mrs. V is in accordance with midwifery service standards, and acomplementary car provide to Mrs. V can reduce maternal complaints and meet maternal needs.

Keyword: Continuou care , primipara midwifery

1Bella Tarmizi (D3) University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

2 Elvika Fit Ari Shanti (D3) University OF Jenderal Achmad Yani Yogyakarta