

**The care of obstetrics sustainable on Mrs. R age 24 years Primipara in
PMB Tatik Suprihatin, Bantul, Yogyakarta
Ade Riana Amelia¹, Fatimah Dewi Anggraeni²**

ABSTRACT

Background: *One of the biggest risk factors for maternal death during childbirth is bleeding caused by anemia. One of the efforts to overcome anemia in pregnant women is by administering FE 90 tablets during pregnancy and the provision of continuity of care (COC) to ensure maternal and fetal health.*

Purpose: *Able to apply midwifery management and midwifery care performed on Mrs. R age 24 primipara continuously in PMB Tatik Suprihatin Bantul.*

Method: *This type of research uses descriptive reports using case study designs and approaches comparatively from pregnancy to nifas.*

Results: *The results of ongoing foster care assistance ranging from pregnancy, childbirth, newborns, to choosing contraceptives under normal circumstances so that the care provided is in accordance with the standards of obstetric services and no gaps are found.*

Conclusion: *Overall researchers have conducted continuous care starting since pregnancy, childbirth, nifas and BBL. Provide complementary care according to the needs needed.*

Keywords: *Continuous Obstetrics Care, Pregnancy Risk Factors, Mild Anemia.*

-
1. Ade Riana Amelia (D-3) University of Achmad Yani Yogyakarta
 2. Fatimah Dewi Anggraeni, S.ST., MPH (D-3) University of Achmad Yani Yogyakarta

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. R UMUR 24
TAHUN PRIMIPARA DI PMB TATIK SUPRIHATIN BANTUL
YOGYAKARTA**

Ade Riana Amelia¹, Fatimah Dewi Anggraeni²

INTISARI

Latar Belakang: Salah satu faktor risiko terbesar terjadinya kematian ibu pada saat melahirkan yaitu pendarahan yang disebabkan oleh anemia. Salah satu upaya untuk mengatasi anemia pada ibu hamil yaitu dengan cara pemberian tablet FE 90 tablet selama kehamilan dan dilakukannya pendampingan dengan cara Continuity of Care (COC) untuk terjaminnya kesehatan ibu dan janin.

Tujuan: Mampu menerapkan manajemen kebidanan dan asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny. R umur 24 tahun primipara secara berkesinambungan di PMB Tatik Suprihatin Bantul.

Metode: Jenis penelitian menggunakan laporan deskriptif dengan menggunakan desain studi kasus dan pendekatan secara komperhensif dari masa kehamilan sampai nifas.

Hasil: Hasil dari pendampingan asuhan secara berkesinambungan yang dilakukan mulai dari hamil, persalinan, bayi baru lahir, hingga memilih alat kontrasepsi dalam keadaan normal sehingga asuhan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan tidak ditemukannya kesenjangan.

Kesimpulan: Secara keseluruhan peneliti telah melakukan asuhan berkesinambungan yang di mulai sejak hamil, persalinan, nifas dan BBL. Secara memberikan asuhan komplementer sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Asuhan Kebidanan Berkesinambungan, Faktor Resiko Kehamilan, Anemia Ringan.

-
1. Ade Riana Amelia (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
 2. Fatimah Dewi Anggraeni, S.ST., MPH (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta