

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. W  
UMUR 33 TAHUN MULTIGRAVIDADI PMB TUTIK PURWANI  
SLEMAN YOGYAKARTA**

Witia Herleni<sup>1</sup>, Ristiana Eka Ariningtyas<sup>2</sup>

**RINGKASAN**

**Latar Belakang :**Salah satu faktor penyebab kematian ibu adalah hamil disertai risiko tinggi yaitu primi tua sekunder (jarak kehamilan terlalu jauh) merupakan ibu hamil dengan persalinan terakhir  $\geq 10$  tahun yang lalu, untuk mengurangi terjadinya kematian pada ibu diperlukan asuhan kebidanan berkesinambungan. Asuhan kebidanan berkesinambungan (*Continuity of Care*) merupakan asuhan atau pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh yang dapat memantau kondisi perkembangan ibu sehingga akan menghasilkan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB yang berkualitas.

**Tujuan :**Memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan (*Continuity of Care*) dari hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB sesuai standar pelayanan kebidanan dengan menggunakan pendokumentasian SOAP.

**Metode :**Metode asuhan kebidanan berkesinambungan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi penelaahan kasus (*Case Study*)

**Hasil :**Asuhan kebidanan pada Ny. W dimulai dari usia kehamilan 22 minggu, kunjungan dilakukan sebanyak 4 kali, ditemukan anemia ringan pada TM III dan telah diberikan asuhan KIE tablet Fe, sayur-sayuran hijau untuk mengatasi anemia ringan. Ny. W bersalin normal, nifas dalam keadaan normal, dan bayi baru lahir normal tidak ada keluhan.

**Kesimpulan :**Asuhan berkesinambungan dan komplementer yang diberikan pada Ny. W telah sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

**Kata Kunci : Asuhan Berkesinambungan, Multigravida, Kebidanan**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Kebidanan (D3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup>Dosen Prodi Kebidanan (D3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**MIDWIFERY CARE CONTINUES IN NY. W  
AGE 33 YEARS MULTIGRAVIDADI PMB TUTIK PURWANI  
SLEMAN YOGYAKARTA**

*Witia Herleni<sup>1</sup>, Ristiana Eka Ariningtyas<sup>2</sup>*

**ABSTRAK**

*Background : One of the factors causing maternal death is pregnancy with a high risk of secondary primi secondary (the distance of pregnancy is too far) is a pregnant woman with the last labor  $\geq 10$  years ago, to reduce the occurrence of death in mothers requires continuous obstetric care. Continuous midwifery care (Continuity of Care) is a complete or comprehensive care or examination that can monitor the condition of the mother's development so that it will produce a quality pregnancy, childbirth, newborns and family planning.*

*Objective : To provide continuous midwifery care (Continuity of Care) from pregnancy, childbirth, newborns and family planning according to midwifery service standards using SOAP documentation.*

*Method : The continuous midwifery care method used is a descriptive research method with the type of descriptive research used is a case study.*

*Results : Midwifery care for Mrs. W started at 22 weeks' gestation, visited 4 times, found mild anemia in TM III and was given care of KIE Fe tablets, green vegetables to overcome mild anemia. Mrs. W was delivered normally, the puerperium was in a normal condition, and normal newborns had no complaints.*

*Conclusion : Continuous and complementary care given to Ny. W is in accordance with midwifery service standards.*

*Keywords : Continuous Care, Multigravida, Midwifery*

---

<sup>1</sup>*Midwifery Student (D3) Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta*

<sup>2</sup>*Lecturer in Midwifery Study Program (D3) Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta*