

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. M UMUR 27
TAHUN MULTIPARA DI BPM EMI NARIMAWATI BANTUL
YOGYAKARTA**

Noviana Tri Astuti¹, NurRahmawati Sholihah²

RINGKASAN

Latar belakang: Angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 35 sedangkan angka kematian Ibu di Bantul pada tahun 2017 sejumlah 9 kasus. Untuk mengurangi AKI diperlukan asuhan kebidanan berkesinambungan. *Continuity of care* merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, pelayanan bayi baru lahir, nifas dan KB sebagai deteksi dini kesehatan ibu.

Tujuan: Melakukan asuhan kebidanan pada Ny. M dari hamil, persalinan nifas dan bayi baru lahir.

Metode:Metode asuhan kebidanan secara berkesinambungan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis studi kasus (*Case Study*)

Hasil: Asuhan berkesinambungan dilakukan dari kehamilan UK 29⁺¹ - 6 minggu postpartum. ANC 4 kali K₁ UK 29⁺¹ minggu keluhan susah BAB, asuhannya KIE ketidaknyamanan susah BAB. K₂ UK 32⁺¹ minggu tidak ada keluhan, asuhanya KIE gizi seimbang. K₃ UK 36 minggu keluhan sering BAK, asuhannya KIE ketidaknyamanan TM III, K₄ UK 37 minggu keluhan cemas, asuhanya komplementer relaksasi nafas dalam. INC kala I 3 jam 30 menit, kala II 40 menit, kala III 10 menit, kala IV 2 jam pertama post partum. BBL asuhannya pijat bayi. PNC asuhannya pijat oksitosin, pemilihan KB suntik 3 bulan

Kesimpulan: Asuhan kebidanan berkesinambungan yang dilakukan pada Ny. M saat hamil ANC 4 kali, BBL 3 kali, PNC 3 kali dan persalinan normal, BB bayi 2300 gram.

Kata Kunci: Asuhan kebidanan berkesinambungan

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan (D-3) UniversitasJenderalAchmadYani Yogyakarta