

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. H
UMUR 35 TAHUN MULTIPARA DI BPM AMBAR D.A
TURI SLEMAN YOGYAKARTA**

Anisa Dwi Lestari¹ , Alfie Ardiana Sari²

RINGKASAN

Faktor penyebab AKI disebabkan karena preeklamsi, perdarahan dan serangan jantung. Program pemerintah untuk menurunkan AKI diantaranya *safe motherhood initiative*, gerakan sayang ibu, *making pregnancy safer* dan EMAS. Peran bidan untuk menurunkan AKI yaitu melakukan asuhan berkesinambungan dari kehamilan, bersalin, BBL dan nifas di BPM Ambar. Tujuan asuhan berkesinambungan yaitu melakukan asuhan pada ibu hamil, bersalin, BBL dan nifas sesuai standar dengan menggunakan pendokumentasian SOAP. Metode yang digunakan yaitu asuhan kebidanan berkesinambungan.

Asuhan kebidanan pada Ny. H berlangsung \pm 13 minggu dari usia kehamilan 31 minggu, bersalin, BBL, nifas. Frekuensi kunjungan hamil 4 kali, persalinan 1 kali, BBL dan nifas 2 kali. Pada kunjungan kehamilan ketiga ibu mengalami anemia ringan, telah dilakukan penatalaksanaan sesuai teori. Persalinan berlangsung di RS kala I 26 jam dilakukan induksi karena kontraksi tidak adekuat, kala II 30 menit, kala III 10 menit, kala IV 2 jam. Tanggal 04/04/2018 jam 10.45 WIB bayi lahir spontan, jenis kelamin laki-laki, BB 3930 gram. Kunjungan BBL berjalan fisiologis. Keluhan masa nifas ASI keluar kurang lancar, penatalaksanaan dengan pijat oksitosin.

Asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny. H sudah sesuai standar. Diharapkan bidan dapat meningkatkan asuhan berkesinambungan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Kata kunci: Asuhan Kebidanan Berkesinambungan, Multipara.

¹ Mahasiswa Program Studi Kebidanan (D3) Universitas Jenderal Achmad Yani

² Dosen Pembimbing Universitas Jenderal Achmad Yani