

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. T UMUR 21 TAHUN PRIMIPARA DI KLINIK HANA KLATEN

Erna Puji Ramadani¹, Silvia Ari Agustina²

INTISARI

Latar Belakang : Lima penyebab pertama kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, eklampsia, partus lama, dan komplikasi abortus sedangkan penyebab tidak langsung yaitu kematian ibu yang disebabkan oleh suatu penyakit yang bukan komplikasi obstetrik, yang berkembang atau bertambah berat akibat kehamilannya atau persalinan seperti kejadian kekurangan energi kronik (KEK)

Tujuan : tujuan *Continuity of care* memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus.

Metode : metode yang digunakan adalah asuhan kebidanan berkesinambungan di Klinik Hana, RSI PDHI Yogyakarta dan kunjungan rumah.

Hasil : Asuhan Kebidanan diberikan pada Ny.T berlangsung selama ± 9 minggu. Asuhan kebidanan pada N.T berlangsung dari UK 33^{+4} - 37^{+6} minggu, bersalin, nifas, neonates, dengan frekuensi kunjungan hamil sebanyak 3 kali, Nifas 3 kali, oKEK (kekurangan energi kronik) dalam kehamilan. pada kunjungan pertama ibu mengeluh pegal-pegal, pada kunjungan kedua ibu mengeluh susah tidur dan sering BAK pada malam hari, pada kunjungan ketiga ibu mengeluh nyeri pada bagian punggung dan merasakan kenceng-kenceng belum teratur. Penulis telah memberikan asuhan sesuai dengan teori. Persalinan berlangsung normal, Bayi lahir normal. asuhan kebidanan pada masa nifas dan neonatus berlangsung normal dan tidak ditemukan penyulit yang menyertai.

Kata Kunci : Asuhan Berkesinambungan

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta