

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian 15 artikel yang telah di review oleh penulis terdapat 17 faktor yang mempengaruhi penggunaan APD oleh perawat. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi tiga domain yaitu, domain pengetahuan, domain pengalaman kerja, dan domain karakteristik individu. Terdapat tiga faktor yang paling sering dibahas oleh beberapa peneliti dari ke 15 artikel yang di *review* penulis dan faktor-faktor tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan APD oleh perawat. Faktor dominan tersebut adalah faktor pengetahuan, faktor pengawasan atau supervisi, dan faktor motivasi.

Karakteristik responden yang dibahas dalam 15 artikel tersebut adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama kerja. Usia responden berada dalam rentang 20 – 55 tahun dan mayoritas berada direntang 20-35 tahun. Mayoritas jenis kelamin responden adalah perempuan. Mayoritas tingkat pendidikan responden adalah D3 Perawat. Lama kerja responden berada dalam rentang 0-35 tahun dan terbanyak pada rentang 0-10 tahun.

#### **B. Saran**

1. Bagi perawat disarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan PPI, meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan kedisiplinan diri dalam mematuhi setiap kebijakan dari pihak manajemen rumah sakit.
2. Bagi instansi rumah sakit, disarankan melakukan pengawasan, evaluasi setiap program-program yang mendukung kepatuhan menggunakan APD oleh perawat, memberikan dukungan positif berupa pemberian *reward*, melengkapi segala kebutuhan sarana pra sarana terkait APD, dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum perawat yang tidak mematuhi SOP rumah sakit.

3. Bagi pihak manajemen rumah sakit, diharapkan dapat mengadakan program-program inovatif terkait dengan pencegahan HAIS berupa diadakannya pelatihan-pelatihan, sosialisasi terkait kecelakaan akibat kerja, sosialisasi SOP tindakan di setiap ruangan, memberikan sanksi kepada perawat yang tidak mematuhi SOP rumah sakit, dan memberikan *reward* kepada perawat yang berprestasi dalam mematuhi SOP rumah sakit.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian secara langsung atau dengan menggunakan data primer sehingga peneliti dapat merasakan langsung proses pengambilan dan pengolahan data primer dengan menambahkan jumlah responden dan atau mengganti metode penelitian dengan metode yang dirasakan lebih efektif, dan meneliti beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi penggunaan APD oleh perawat di rumah sakit seperti faktor karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, dan status perkawinan seseorang.