

GAMBARAN TINGKAT DEPRESI PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIS YANG MENJALANI TERAPI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES YOGYAKARTA

Susanti Ambar Sari¹, Fajriyati Nur Azizah²

INTISARI

Latar Belakang : Pasien gagal ginjal kronik jika Laju Filtrasi Glomerulus < 15 mL/ menit sehingga menjalani terapi hemodialisa untuk mengganti fungsi ginjal. Pasien yang menjalani terapi hemodialisa memiliki dampak pada aspek fisik dan psikologis yang berdampak pada mental pasien, salah satu dampak mental yang dialami adalah depresi.

Tujuan Penelitian : Diketahui gambaran tingkat depresi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Wates Kulon Progo.

Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive* dengan pendekatan *Retrospektif study*. Sampel yang digunakan sebanyak 65 responden dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Penelitian dilakukan pada bulan 11-14 September 2017 di Ruang Hemodialisa RSUD Wates Yogyakarta. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan *descriptive analisis*.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki yaitu 37 responden (56,9%), usia responden sebagian besar adalah 46-55 tahun yaitu 29 responden (44,6%), status pernikahan responden sebagian besar adalah menikah yaitu 52 responden (80,0%), dan sebagian besar lama menjadi pasien HD antara 1-5 tahun yaitu sebesar 42 responden (64,6%). Gambaran tingkat depresi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa sebagian besar adalah termasuk kategori depresi sedang yaitu sebanyak 29 responden (44,6%).

Kesimpulan : Sebagian besar tingkat depresi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani Hemodialisa di RSUD Wates Yogyakarta, termasuk kategori depresi sedang.

Kata Kunci : Depresi, Gagal Ginjal Kronik, Hemodialisa

¹Mahasiswa Keperawatan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Keperawatan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

The Description of Depression Level of Patients With Chronic Renal Failure and Under Hemodialysis Therapy in General Hospital of Wates, Yogyakarta

Susanti Ambar Sari¹, Fajriyati Nur Azizah²

ABSTRACT

Background : Patients with chronic renal failure if glomerulus filtration rate <15 mL to receive hemodialysis therapy in order to replace kidney function. Patients under hemodialysis therapy may experience effects of physical and psychological aspects such as depression.

Objective : To identify The Description of Depression Level of Patients With Chronic Renal Failure and Under Hemodialysis Therapy in General Hospital of Wates, Yogyakarta.

Methods : This study was descriptive with retrospective study approach. Number of samples was 65 respondents selected by applying purposive sampling technique. The study was conducted during 11-14 September 2017 in Hemodialysis room in general hospital of Wates, Yogyakarta. The study result was analyzed by descriptive analysis

Results : The result of study identified that the sex of respondents was mostly male as many as 37 respondents (56,9%), the age of respondents was mostly 46-55 years old as many as 29 respondents (44,6%), the marital status of respondents was mostly married as many as 52 respondents (80,0%), the length of period of becoming patients was mostly 1-5 years as many as 42 respondents (64,6%). The Description of Depression Level of Patients With Chronic Renal Failure and Under Hemodialysis therapy was mostly in moderate depression category as many as 29 respondents (44,6%).

Conclusion : Most of Depression Level of Patients With Chronic Renal Failure and Under Hemodialysis therapy in general hospital of Wates, Yogyakarta, was in moderate depression category

Keywords : Depression, Chronic Renal Failure, Hemodialysis

¹ *Nursing Student STIKES General Achmad Yani Yogyakarta*

² *Lecturer Nursing STIKES General Achmad Yani Yogyakarta*