

## GAMBARAN KONTRASEPSI HORMONAL PADA WANITA KANKER PAYUDARA DI RSUD KOTA YOGYAKARTA

Lailatul fadilah<sup>1</sup>, Imroatul azizah<sup>2</sup>

### INTISARI

**Latar Belakang :** Kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi kedua di Indonesia setelah kanker serviks. Secara Nasional prevalensi kanker pada penduduk Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4% dengan diperkirakan sekitar 347.792 orang. Prevalensi Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 4,1%(Kemenkes RI, 2015). Kontrasepsi hormonal merupakan salah satu penyebab Pertumbuhan jaringan payudara yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesterone (Suryani, dkk 2016).

**Tujuan :** Diketuinya persentase penderita kanker payudara pada pemakaian kontrasepsi hormonal meliputi pil, suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, implant di RSUD Kota Yogyakarta

**Metode Penelitian :** penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. lokasi penelitian di RSUD Kota Yogyakarta. Sampling yang digunakan adalah *Accidental Sampling*. Jumlah populasi sebanyak 71 responden dan jumlah sampel yang digunakan 36 responden kanker payudara. Jenis instrument yang digunakan dalam pengambilan data menggunakan ceklist sebagai alat ukur. Metode pengambilan data primer yang diambil menggunakan *ceklist* dengan responden langsung.

**Hasil :** Persentase pada penderita kanker payudara di RSUD Kota Yogyakarta pada wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal meliputi: kontrasepsi pil sebanyak 15 responden (41,7%), kontrasepsi suntik 1 bulan sebanyak 3 responden (8,3%), suntik 3 bulan sebanyak 12 responden (33,3%), kontrasepsi implant sebanyak 6 responden (16,7%).

**Kesimpulan :** responden yang menderita kanker payudara di RSUD Kota Yogyakarta mayoritas menggunakan kontrasepsi pil sebanyak 15 responden (41,7%).

**Kata Kunci :** kontrasepsi hormonal, penderita kanker payudara, SADARI

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Kebidanan (D3) Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Stikes Jendral Achmad Yani Yogyakarta

## HORMONAL CONTRACEPTION IMAGES IN BREAST CANCER WOMAN IN GENERAL HOSPITAL YOGYAKARTA

Lailatul fadilah<sup>1</sup>, Imroatul azizah<sup>2</sup>

### *ABSTRACT*

**Background:** Breast cancer is the second highest prevalence of cancer in Indonesia after cervical cancer. Nationally the prevalence of cancer in the population of Indonesia in 2013 amounted to 1.4% with an estimated 347,792 people. Prevalence of D.I Yogyakarta Province is 4.1% (Ministry of Health RI, 2015). Hormonal contraception is one of the causes of growth of breast tissue affected by estrogen and progesterone hormones (Suryani, et al 2016).

**Objective:** Knowledge of percentage of breast cancer patient on hormonal contraception include pill, 1 month injection, 3 month injection, implant at RSUD Kota Yogyakarta.

**Research Method:** This research uses quantitative descriptive. Research location at RSUD Kota Yogyakarta. Sampling used is Accidental Sampling. The total population of 71 respondents and the number of samples used 36 respondents breast cancer. The type of instrument used in taking data using a checklist as a measuring tool. The primary data retrieval method is taken using a checklist with the respondent directly.

**Result:** Percentage in breast cancer patient at RSUD Kota Yogyakarta in woman using hormonal contraception include: Contraception pill as much as 15 respondents (41,7%), contraception 1 month as many as 3 respondents (8,3%), 3 month injection as much as 12 respondents (33,3%), implant contraception counted 6 respondents (16,7%).

**Conclusion:** respondents who suffer from breast cancer in RSUD Yogyakarta City mostly use pill contraception counted 15 respondents (41,7%).

**Keywords:** hormonal contraception, breast cancer patients, BSE

---

<sup>1</sup>Student of Midwifery Study Program (D3) Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup>Supervisor of Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta