

INTISARI

STUDI DESKRIPTIF FAKTOR PENYEBAB STUNTING PADA BALITA DI DESA WUNUNG WONOSARI GUNUNGKIDUL

Tiza Puri Saravina¹, Endah Puji Astuti²

Latar Belakang: *Stunting* merupakan kejadian kurang gizi yang dapat menjadikan perhatian di negara-negara berkembang. Permasalahan *stunting* di Indonesia dimulai dari masalah gizi, sosial ekonomi, bblr, keturunan, penyakit infeksi, pemberian ASI Eksklusif, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan untuk mengurangi kejadian *stunting*.

Tujuan Penelitian: Mengetahui faktor penyebab *stunting* pada balita di Desa Wunung, Wonosari, Gunungkidul.

Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di Desa Wunung Wonosari Gunungkidul. Waktu pelaksanaan pada tanggal 3 Mei 2017. Jumlah responden 57 balita dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Alat pengambilan data menggunakan angket dan *metline*, variabel penelitian ini yaitu variabel tunggal dan analisa univariat.

Hasil: Faktor penyebab *stunting* pada balita dalam kategori riwayat keturunan sebanyak 30 responden (52,6%), riwayat penyakit infeksi sebanyak 26 responden (45,6%), riwayat berat lahir sebanyak 5 responden (8,8%), riwayat pemberian ASI Eksklusif sebanyak 49 responden (86,0%).

Kesimpulan: Hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor penyebab *stunting* pada balita di Desa Wunung Wonosari Gunungkidul terlihat dari riwayat keturunan dan riwayat pemberian ASI Eksklusif yang mempengaruhi kejadian *stunting*.

Kata Kunci: Balita, *Stunting*

¹ Mahasiswa Kebidanan (D-3) Stikes Achmad Yani Yogyakarta

² Pembimbing Karya Tulis Ilmiah

ABSTRACT

DESCRIPTIVE STUDY RISK FACTOR STUNTING IN TODDLERS IN WUNUNG WONOSARI GUNUNGKIDUL

Tiza Puri Saravina¹, Endah Puji Astuti²

Background: Stunted is an incidence of malnutrition that can make attention in developing countries. Stunting problems in Indonesia ranging from nutritional, socioeconomic, low birth weight, heredity, infectious disease, exclusive breastfeeding, therefore it's necessary to take preventive measures to reduce the incidence of stunting.

Objective: Know the risk factor stunting in toddlers in Wunung Wonosari Gunungkidul.

Method: This research method is quantitative descriptive. Research location at Wunung Wonosari Gunungkidul. The timing of on may 3, 2017. The number of respondents 57 toddlers with a sampling technique using total sampling, data collection tools using questionnaires and metric, data analysis using univariate analysis distribusi frekuensi.

Output: causative factor stunting toddler category as many as 30 respondents (52,6%), history of infectious diseases as much as 26 respondents (45,6%), birth weight history as 5 respondents , history of giving ation as 49 respondents (86,0%).

Conclusion: The results of this study found that factors causing stunting in toddlers in the Wunung Wonosari Gunungkidul seen from the history exclusive affecting.

Keywords: Toddlers, Stunting

¹ Student of (D-3) Midwifery Program of A. Yani Yogyakarta School of Health Science

² Counseling lecturer of Diploma III Midwife Study of A. Yani Yogyakarta School of Health Science