

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY S UMUR 34
TAHUN MULTIGRAVIDA DI KLINIK ASIH WALUYO JATI
BANTUL YOGYAKARTA**

Puspita Wardani¹ Ratna Prashesti²

RINGKASAN

Latar Belakang: Penyebab utama AKI di Bantul adalah perdarahan (17%). Bidan berperan dalam menurunkan AKI melalui *continuity of care* Ibu hamil dengan APGO kelompok 7 terlalu dan 3 pernah, meliputi ibu hamil dengan jarak kehamilan < 2 tahun dan riwayat melahirkan bayi besar memiliki risiko mengalami perdarahan postpartum.

Tujuan: Menerapkan manajemen asuhan kebidanan secara berkesinambungan pada Ny.S umur 34 tahun multipara sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah studi penelaahan kasus (*Case Study*).

Hasil: Asuhan berkesinambungan diberikan dari kehamilan sampai nifas. ANC dilakukan 4 kali. ANC I UK 20⁴ minggu masalah 7 T dan 3 pernah. ANC II UK 25⁵ minggu masalah letak lintang asuhan metode *knee chest*. ANC III UK 34⁵ minggu masalah anemia asuhan KIE zat besi dan sari kurma. ANC IV UK 39¹ minggu diberikan asuhan kehamilan normal. KF dilakukan 3 kali. KF I ditemukan masalah nyeri luka jahitan perineum pada hari ke 1 asuhan perawatan luka jahitan perineum. KF 3 Ny.S memilih kontrasepsi IUD non hormonal. KN dilakukan 3 kali. KF II ditemukan masalah *rheum* pada hari ke 6.

Kesimpulan: Asuhan kebidanan berkesinambungan dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir telah dilakukan sesuai standar pelayanan kebidanan.

Kata kunci: Asuhan berkesinambungan, Multipara, Kebidanan

¹ Mahasiswa Program Studi Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani.

² Dosen Pembimbing Program Studi Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani.