

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN
PADA NY P UMUR 31 TAHUN G2P1A0AH1
DI KLINIK KEDATON BANTUL**

Irma Reyuni¹, Endah Puji Astuti²

RINGKASAN

Latar Belakang: Kehamilan berisiko merupakan kehamilan yang dapat mengancam ibu hamil dan bayinya. Salah satu faktor risiko pada kehamilan adalah jarak yang terlalu jauh. Ibu dalam kehamilan dan persalinan ini seolah-olah menghadapi persalinan yang pertama lagi. Bahaya yang dapat terjadi antara lain persalinan dapat berjalan tidak lancar, pendarahan pascapersalinan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk memberikan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care*, sehingga terjalin hubungan berkelanjutan antara pasien dengan bidan untuk mencegah komplikasi yang mungkin terjadi.

Tujuan: memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny P umur 31 tahun G2P1A0Ah1 Multipara dengan jarak kehamilan 13 tahun di Klinik Kedaton.

Metode: penelitian ini menggunakan metode deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*Case Study*).

Hasil: Kunjungan kehamilan dilakukan sebanyak 4x. Ibu mengalami ketidaknyamanan di TM III dan diberikan KIE ketidaknyamanan di TM III. Setelah diberikan konseling keluhan yang dirasakan ibu berkurang. Bersalin tanggal 19 April 2019 di Klinik Kedaton normal. Kala I berlangsung 8 jam, kala II 20 menit, kala III 9 menit, dan kala IV 2 jam. Bayi lahir normal pukul 15.20 WIB, BB 3000 gram, PB: 47 cm. Kunjungan nifas dilakukan 3x, ditemukan hasil ASI belum lancar pada kunjungan pertama sehingga diberikan terapi pijat oksitosin, kunjungan neonatus dilakukan 3x dengan hasil normal.

Kesimpulan: asuhan kebidanan berkesinambungan dari hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dilakukan sesuai standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Asuhan Berkesinambungan.

¹ mahasiswa kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² dosen kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

MIDWIFERY CARE CONTINUES AT NY P AGE 31 YEARS IN THE KEDATON CLINIC BANTUL

Irma Reyuni¹, Endah Puji Astuti²

ABSTRAK

Background: Risk pregnancy is a pregnancy that can threaten pregnant women and their babies. One risk factor for pregnancy is too much distance. Mothers in pregnancy and childbirth as if facing the first birth again. Dangers that can occur include labor can run smoothly, postpartum bleeding. Based on this, the researchers are interested in providing Continuity of Care midwifery care, so that there is an ongoing relationship between patients and midwives to prevent complications that might occur.

Objective: to provide continuous care to Mrs. P 31 years old G2P1A0Ah1 Multipara with a distance of 13 years of pregnancy at the Kedaton Clinic. **Method:** this study uses descriptive methods, the type of research used is a case study (Case Study).

Results: 4x pregnancy visits are carried out. The mother experiences TM III discomfort and is given KIE TM III discomfort. After being given counseling complaints felt by the mother reduced. Birth on April 19, 2019 at the Kedaton Clinic was normal. Kala I lasts 8 hours, when II is 20 minutes, when III is 9 minutes, and when IV is 2 hours. Normal babies born at 15.20 WIB, BB 3000 grams, PB: 47 cm. Postpartum visits performed 3 times, found the results of breast milk is not smooth at the first visit so given oxytocin massage therapy, neonate visits performed 3 times with normal results.

Conclusion: Continuous midwifery care from pregnancy, childbirth, childbirth, and newborns is carried out according to the standards of obstetric care.

Keywords: Continuous Care.

¹ midwifery student (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² University Midwifery (D-3) lecturers at General Achmad Yani