

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di antaranya:

1. Ulkus diabetik di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta banyak terjadi pada pasien berusia >45 tahun (89,74%), berjenis kelamin wanita (50,43%), dan mempunyai penyakit penyerta non infeksi (69.23%).
2. Pola penggunaan Antibiotik empiris yang sering digunakan adalah kombinasi 2 antibiotik, yaitu kombinasi Ceftriaxone + Metronidazole (35,04%).
3. Penggunaan antibiotik empiris sesuai dengan *guideline* IDSA pada pengobatan pasien ulkus diabetik di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 41%.
4. Terdapat hubungan antara kesesuaian antibiotik empiris dengan *clinical outcome* pasien ulkus diabetik di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan nilai $p=0,004$ ($p<0,05$).

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan menggunakan pedoman penggunaan antibiotik yang terbaru untuk mengevaluasi kesesuaian antibiotik empiris.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan menambahkan parameter klinik berupa leukosit sebagai *marker*/penanda dari suatu infeksi yang dapat memengaruhi *clinical outcome*.