

**NURSING CARE FOR RANGE OF MOTION PATIENTS IN MR. A AND
MR. H IN EFFORTS TO INCREASE MUSCLE STRENGTH IN PATIENTS
NON HEMORRHAGIC STROKE (SNH) IN THE RAUDHAH ROOM OF PKU
HOSPITAL MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Agung Praatama Putra¹, Novita Nirmala Sari²

E-Mail : putraagungpratama@gmail.com

ABSTRACT

Background : Stroke occurs when the blood supply to parts of the brain is reduced due to blockage or when the blood vessels in the brain are damaged, thus causing the patient to become paralyzed from paralysis and makes the patient unable to carry out normal activities, Therefore, we will teach ROM, Range Of Motion, making movements with the hands, training on the legs so they don't get stiff, the exercises are done 4 times a week, repeatedly.

Objective : to analyze nursing care for SNH (Non-hemorrhagic stroke) patients with implementation of ROM range of motion at PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta.

Methodology : This study uses a method using a participant observation method in which the patients with implementation of ROM range of motion at PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta. Lifting, bending the lower leg.

Result : ROM or Range of motion can be given to anyone, for example Mr F where Mr, s, before the ROM was done the patient was quite painful to move but After the ROM procedure is carried out, the patient can perform simple movements such as: Raise your hands.

Keyword : Stroke, ROM, SHN

¹Nursing Professional Student, Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta

² Lecturer at Bachelor of Nursing, Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta.

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *RANGE OF MOTION* PADA
Tn. A DAN Tn.H DALAM UPAYA PENINGKATAN KEKUATAN OTOT
PADA PASIEN STROKE NON HEMORAGIK (SNH) DI RUANG
RAUDHAH RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Agung Praatama Putra¹.Novita Nirmala Sari²
E-MAIL : putraagungpratama@gmail.com

INTISARI

Latar blakang: Penyakit stroke terjadi ketika suplai darah ke bagian otak berkurang karena penyumbatan atau ketika pembuluh darah di otak pecah, sehingga menyebabkan pasien menjadi kemplupuhan dari kelumpuhan dan menjadikan pasien tidak bisa melakukan aktivitas biasa, maka dari itu akan di ajarkan rom, Range Off Motion, melalukan gerkan pada tangan, melatih pada kaki agar tidak kaku lagu, latihan di lakukan seminggu 4x, sampai berulang-ulang.

Tujuan : Untuk menganalisis asuhan keperawatan pasien SNH (stroke non hemoragik) dengan penerapan ROM range off mosiondi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta,

Metedologi : Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode metode obserfasi-partisipasif yang di mana kaki dan tangan pasien di latih untuk melakukan gerakan menekuk, mengangkat, menekuk kaki bagian bawah.

Hasil : ROM atau Range of motion dapat di berikan pada siapa saja contohnya pada Tn,F dimana Tn, s, sebelum di lakukan ROM pasien cukup kesakitan melakukan pergerakan tetapi setelah dilakukan tindakan ROM pasien sudah bisa malkukan gerakan gerakan sedrhana seperti angkat tangan.

Kata Kunci: *Stroke, ROM, SHN*

¹Mahasiswa Profesi Ners Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen S1 Keperawatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.