

GAMBARAN DEPRESI PADA PASIEN STROKE DI RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA

Rita Fatma Sari¹, Miftafu Darussalam²
Email: ritafatmasari26@gmail.com

INTISARI

Latar Belakang: Tingkat kejadian stroke di Indonesia semakin tinggi dari 7% pada tahun 2013 menjadi 10,9% pada tahun 2018. Pada tahun 2018 DIY menjadi peringkat tertinggi ke-2 mengenai stroke. Penderita stroke adalah 11 persen laki-laki dan perempuan 10,9 persen. Stroke adalah penyakit yang menyebabkan kematian, cacat fisik dan psikologis serta dapat menyebabkan depresi dan frustrasi.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui tingkat depresi pada pasien stroke di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan *metode deskriptif* dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana jumlah sampel yang diambil sebanyak 31 responden menggunakan alat ukur kuesioner *Beck Depression Inventory II*.

Hasil: Berdasarkan karakteristik responden pasien stroke sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu 18 responden (58,1%), usia dalam rentang 65-74 tahun yaitu 13 responden (41.9%), tingkat pendidikan SMA/SMK/SLTA yaitu 14 responden (45.2%), pekerjaan pada responden tidak bekerja yaitu 21 responden (67.7%). Tingkat depresi pada pasien stroke berada pada tingkat depresi sedang, yaitu 14 responden (45,2%).

Kesimpulan: Gambaran tingkat depresi pada pasien stroke di rumah sakit Bethesda Yogyakarta adalah tingkat depresi normal 5 responden (16.1%), ringan 9 (29.0%), sedang 14 responden (45.2%) dan berat 3 responden (9.7%).

Kata kunci: Depresi, Stroke

¹ Mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen S1 Keperawatan Universitas Jendral Achmad Yani, Yogyakarta

DESCRIPTION OF DEPRESSION IN STROKE PATIENTS AT BETHESDA HOSPITAL YOGYAKARTA

Rita Fatma Sari ¹, Miftafu Darussalam²
Email: ritafatmasari26@gmail.com

ABSTRACT

Background: The incidence rate of stroke in Indonesia is getting higher from 7% in 2013 to 10.9% in 2018. In 2018 DIY became the 2nd highest ranked regarding stroke. Stroke sufferers are 11 percent male and female 10.9 percent. Stroke is a disease that causes death, physical and psychological disability and can lead to depression and frustration.

Research Objective: To determine the level of depression in stroke patients at Bethesda Hospital Yogyakarta.

Research Method: The research uses a *descriptive method* with a quantitative approach. The sampling technique used *purposive sampling* where the number of samples taken was 31 respondents using the *Beck Depression Inventory II questionnaire measuring tool*.

Results: Based on the characteristics of the respondents, most of the stroke patients were male, namely 18 respondents (58.1%), age in the range of 65-74 years, namely 13 respondents (41.9%), high school/vocational/high school education level, 14 respondents (45.2%), and 21 respondents (67.7%). The level of depression in stroke patients was at a moderate depression level, namely 14 respondents (45.2%).

Conclusion: The description of the level of depression in stroke patients at Bethesda Hospital Yogyakarta was normal depression level of 5 respondents (16.1%), mild 9 (29.0%), moderate 14 respondents (45.2%) and severe 3 respondents (9.7%).

Keywords: Depression, Stroke

¹ S1 Nursing Student of General Achmad Yani University Yogyakarta

² S1 Lecturer in Nursing General Achmad Yani University Yogyakarta