

## GAMBARAN PENYEBAB KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DARI FAKTOR IBU DI RSUD WONOSARI

Lindawati.s<sup>1</sup>, Grhasta Dian Perestroika<sup>2</sup>

### INTISARI

**Latar Belakang:** Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan penyebab kesakitan dan kematian. Hasil survei SDKI Tahun 2012 menyatakan bahwa AKB di DIY sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup dan 400 kasus kematian neonatal disebabkan oleh BBLR. Angka kejadian BBLR tertinggi di DIY terdapat di Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,80%.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyebab kejadian BBLR dari faktor ibu di RSUD Wonosari Yogyakarta Tahun 2013.

**Metode:** Jenis penelitian yang digunakan *deskriptif kuantitatif* dengan pendekatan studi *retrospektif*. Pengambilan sampel dengan *teknik simple random sampling* dan diperoleh 71 sampel penelitian pada bulan Januari-Desember 2013 di RSUD Wonosari.

**Hasil:** Hasil penelitian didapatkan bahwa BBLR yang terjadi di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 dari faktor ibu yaitu umur < 20 tahun 22,5%, 20-35 tahun 57,7%, > 35 tahun 19,7%., Dipengaruhi paritas primipara 56,3 %, multipara 43,7%, grandemultipara 0% dan dari tingkat pendidikan yaitu tidak Sekolah 14,1%, SD 18,3%, SMP 47,9%, SMA 18,3% dan Perguruan Tinggi 1,4%.

**Kesimpulan:** Penyebab BBLR dari faktor ibu yang mempengaruhi antara lain usia 20-35 tahun, primipara dan tingkat pendidikan SMP.

**Kata Kunci:** Gambaran, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Faktor ibu.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Diploma DIII Kebidanan STIKES A. Yani Yogyakarta

<sup>2</sup>Dosen STIKES A.Yani Yogyakarta

## DESCRIPTION OF INCIDENT CAUSE OF LOW BIRTH WEIGHT INFANT FROM MATERNAL FACTORS IN RSUD WONOSARI

Lindawati.s<sup>1</sup>, Grhasta Dian Perestroika<sup>2</sup>

### ABSTRACT

**Background:** Low birth weight (LBW) infant was a cause of morbidity and mortality. The result of SDKI survey's in 2012 stated that the IMR in the DIY Provincial account 24 per 1,000 live birth and 400 of neonates mortality that cases were caused by LBW. The highest incidence of LBW in DIY found in Gunungkidul Residence account 5,80%.

**Objective:** This study aims to know about description of the LBW incidence causes from maternal factors in RSUD Wonosari Yogyakarta in 2013.

**Methods:** The research used a quantitative descriptive retrospective study approach. Sampling with simple random sampling technique and the sample obtained 71 months from January to Desember 2013 in the RSUD Wonosari.

**Results:** The results of a study reported that LBW occurred in RSUD WonosariGunungkidul Year 2013 from maternal factors, namely age <20 years 22,5%, 20-35 years 57,7% and >35 years 19,7%. Influenced of primiparous parity 56,3%, multiparous 43,7%, grandemultiparous 0%. And from of school 18,3% junior high school, senior high school 47,9% and university 1,4%.

**Conclusion:** The cause of LBW from maternal which affecting, consist of age 20-35 years, primiparous and junior high education.

**Keywords:** Description, Low Birth Weight (LBW), Maternal factors

- 
- 1) High student of D-III Midwife STIKES JendralAchmadYani Yogyakarta
  - 2) Lecturer of STIKES JendralAchmadYani Yogyakarta