

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ibu hamil trimester III memiliki TFU tidak sesuai usia kehamilan sebanyak 26 orang (81,2%).

B. Saran

Mengacu dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang diajukan dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan

1. Bagi Teoritis

Teori TFU ibu hamil hendaknya dikembangkan lagi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan penelitian terbaru sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemeriksaan deteksi awal pertumbuhan janin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Puskesmas Tepus II Gunungkidul

Puskesmas lebih mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk pelayanan kesehatan pada ibu hamil sehingga dapat mendeteksi BBLR.

b. Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan

Memberikan perhatian dan pemantauan secara rutin pada ibu hamil khususnya dengan indikasi BBLR.

c. Bagi mahasiswa kebidanan STIKES A.YANI

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa stikes A.Yani yang berkaitan dengan TFU ibu hamil.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan melihat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian BBLR.