

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang proporsi penanganan demam pada bayi umur 2-4 bulan pasca imunisasi DPT combo di Puskesmas Dlingo I Bantul Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proporsi penanganan demam pada bayi umur 2-4 bulan pasca imunisasi DPT Combo, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan kategori cukup sebanyak 38 responden.
2. Proporsi pengetahuan ibu tentang demam, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan kategori cukup sebanyak 39 responden.
3. Proporsi upaya penanganan demam, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan kategori cukup sebanyak 37 responden.
4. Proporsi pemberian ASI saat bayi demam, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan kategori cukup sebanyak 35 responden.
5. Proporsi pemberian obat saat bayi demam, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan kategori cukup sebanyak 32 responden.
6. Proporsi menyelimuti bayi saat bayi demam, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan kategori cukup sebanyak 34 responden.
7. Proporsi mengompres bayi saat bayi demam, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan kategori cukup sebanyak 29 responden.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi ibu yang mempunyai bayi 2-4 bulan

Dari penelitian ini diharapkan ibu yang mempunyai bayi 2-4 bulan tetap mencari informasi tentang cara penanganan demam pasca imunisasi melalui tenaga kesehatan, media elektronik dan media cetak.

2. Bagi bidan

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat menjadi dasar pemikiran bidan di Puskesmas Dlingo I Bantul agar lebih meningkatkan pelayanan imunisasi secara lebih maksimal dan dapat memberikan informasi tentang efek samping dan cara penanganan demam pasca imunisasi.

3. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman serta ketrampilan bagi peneliti untuk dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut.

4. Bagi peneliti lain

Diharapkan tidak hanya meneliti penanganan demam saja tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi proporsi penanganan demam pasca imunisasi.