

FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN PERDARAHAN *POSTPARTUM* PRIMER DI RSUD SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2012

Intan Yudistia Febriane¹, Tyasning Yuni A.A,S.ST,M.Kes², Ristiana Eka A,S.ST³

INTISARI

Latar belakang : Tingginya angka kematian ibu saat ini masih merupakan masalah besar di dunia termasuk Indonesia. Perdarahan merupakan salah satu penyebab kematian ibu. Perdarahan *postpartum* primer merupakan perdarahan yang paling banyak menyebabkan kematian dengan jumlah perdarahan setelah anak lahir melebihi 500 ml, pada 24 jam pertama. Penyebab perdarahan *postpartum* primer adalah atonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir dan gangguan pembekuan darah, di DIY selama tahun 2011 terdapat 180 kasus perdarahan *postpartum*.

Tujuan : Mengetahui faktor penyebab kejadian perdarahan *postpartum* pada ibu bersalin di RSUD Sleman tahun 2012.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yang berjumlah 26 ibu bersalin yang mengalami perdarahan *postpartum* yang disebabkan oleh atonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir dan gangguan pembekuan darah. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dengan hasil berupa prosentase (%).

Hasil dan kesimpulan: Retensio plasenta menjadi faktor utama penyebab perdarahan *postpartum* sebesar 15 (57,7%) kedua atonia uteri sebesar 8 (30,8%) ketiga robekan jalan lahir sebesar 3 (11,5%) dan untuk gangguan pembekuan darah tidak ditemukan (0%).

Saran : meningkatkan penanganan kegawat daruratan perdarahan *postpartum*

Kata kunci : Perdarahan *postpartum*, faktor penyebab, *case control*, retensio plasenta.

-
1. Mahasiswi D3 Kebidanan STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
 2. Dosen STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
 3. Dosen STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

PREDISPOSITION FACTORS OF POSTPARTUM HEMORRHAGE INCIDENTS IN THE YEAR 2011 YOGYAKARTA SLEMAN HOSPITAL

Intan Yudistia Febriane ¹, Tyasning Yuni.A.A,S.ST.M.Kes², Ristiana Eka A,S.ST ³

ABSTRACT

Background: The high rate of maternal mortality is still a major problem in the world, including Indonesia. Bleeding is one of the causes of maternal death. Case bleeding is bleeding postpartum, in DIY during the year 2011 there were 180 cases of postpartum hemorrhage.

Objective: To know the factors predisposing causes of postpartum bleeding incidents most.

Methods: The study used method Retrospective. The study included 34 cases of birth mothers with postpartum hemorrhage in 2011. The variables studied were age, parity, conditions related to pregnancy and childbirth (multiple pregnancy, large fetus), prolonged labor, anemia, induction of labor.

Results and conclusions: Anemia is the highest common factor causing postpartum hemorrhage. Of the 34 cases there were 20 cases of postpartum hemorrhage mothers suffering from anemia and 14 others do not suffer from anemia.

Keywords: postpartum hemorrhage, predisposing factors, case-control, anemia

-
1. Midwifery student D3 STIKES General Achmad Yani Yogyakarta
 2. Lecturer STIKES General Achmad Yani Yogyakarta
 3. Lecturer STIKES General Achmad Yani Yogyakarta