

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan melihat dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor retensio plasenta menjadi penyebab paling banyak pada perdarahan *postpartum* berjumlah 15 (57,7%) dan tidak retensio plasenta (42,3%).
2. Faktor atonia uteri penyebab terjadinya perdarahan *postpartum* berjumlah 8 (30,8%) dan tidak atonia uteri (69,2%).
3. Faktor robekan jalan lahir penyebab terjadinya perdarahan *postpartum* berjumlah 3 (11,5%) dan tidak robekan jalan lahir (88,5%).
4. Faktor gangguan pembekuan darah menjadi penyebab perdarahan *postpartum* tetapi tidak ditemukan pada kasus perdarahan *postpartum* di RSUD Sleman Yogyakarta tahun 2012.
5. Faktor umur menjadi predisposisi terjadinya perdarahan *postpartum*, umur 20-35 berjumlah 16 (61,5%), umur >35 berjumlah 8 (30,8%), umur <20 berjumlah 2 (7,7%). Faktor jumlah paritas menjadi predisposisi perdarahan *postpartum*, primigravida berjumlah 10 (37%), multigravida dan grandemultipara berjumlah masing-masing 8 (29,6%). Faktor kehamilan kembar menjadi predisposisi, 3 (11,1%) mengalami kehamilan kembar, 23 (85,2%) tidak mengalami kehamilan kembar. Faktor janin

besar menjadi predisposisi, 8 (30,8%) mengalami janin besar, 18 (69,2%) tidak mengalami janin besar. Faktor partus lama menjadi predisposisi, 6 (23,1%) dengan partus lama dan 20 (76,9%) tidak dengan partus lama. Faktor induksi menjadi predisposisi, 2 (7,7%) dengan induksi dan 24 (92,3%) tidak dengan induksi. Faktor anemia menjadi predisposisi, 6 (23,1%) dengan anemia dan 20 (76,9%) tidak dengan anemia. Faktor cara persalinan menjadi predisposisi, 1 (3,8%) dengan *vakum ekstraksi* dan 25 (96,2%) tidak dengan *vakum ekstraksi*.

### **B. Saran**

a. Kepada RSUD Sleman

Mengelola sebaik mungkin penanganan perdarahan postpartum, lebih dapat meningkatkan pelayanan kegawat daruratan pada maternal agar dapat menekan Angka Kematian Ibu.

b. Kepada peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian ilmiah, dapat menambah kemampuan serta pengetahuan tentang perdarahan postpartum.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan penelitian ini.

c. Kepada STIKES Achmad Yani

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, sumber pustaka, dan bahan kajian tentang kejadian perdarahan postpartum.