

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima yaitu sebagai berikut:

1. Pengalaman orangtua tentang hospitalisasi di bangsal Cempaka RSUD Wates Kulon Progo sebagian besar orangtua yang anaknya pertama kali dirawat di rumah sakit sebanyak 16 orangtua (53,3%).
2. Tingkat kecemasan pada anak usia pra sekolah di bangsal Cempaka RSUD Wates Kulon Progo sebagian besar adalah kategori kecemasan sedang sebanyak 16 anak (53,3%).
3. Terdapat hubungan pengalaman orangtua tentang hospitalisasi dengan tingkat kecemasan pada anak usia pra sekolah di bangsal Cempaka RSUD Wates Kulon Progo dengan hasil uji korelasi *Kendall's Tau* diperoleh nilai *p-value* (0,000) ($p < 0,01$).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Keperawatan Anak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, khususnya bagi Ilmu Keperawatan Anak tentang pengalaman orangtua selama anak dirawat di rumah sakit dengan tingkat kecemasannya.

2. Bagi Orangtua di bangsal Cempaka RSUD Wates Kulon Progo

Hasil penelitian ini diharapkan orangtua mampu mengetahui tentang pentingnya pengalaman selama anak dirawat di rumah sakit agar kecemasan anak dapat diminimalkan.

3. Bagi Perawat di bangsal Cempaka RSUD Wates Kulon Progo

Hasil penelitian ini diharapkan perawat mampu memberikan informasi tentang pentingnya hospitalisasi kepada orangtua selama anaknya dirawat di rumah sakit, terutama orangtua yang anaknya pertama kali dirawat di rumah sakit agar orangtua mampu mengetahui bagaimana cara meminimalkan kecemasan anak selama proses perawatan di rumah sakit.

4. Bagi Mahasiswa di Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, khususnya pengalaman orangtua tentang hospitalisasi dengan tingkat kecemasan anak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan selanjutnya bisa dilakukan dengan menambah faktor-faktor lain pada variabel bebas yang berhubungan dengan tingkat kecemasan anak selama di rumah sakit. Selain itu perlu menambah jumlah responden dan juga adanya asisten penelitian minimal 2 orang agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar.