

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Karakteristik responden berdasarkan usia sebagian besar usia 7 tahun sebanyak 8 responden (23,5%), berdasarkan karakteristik jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 responden (61,8%), berdasarkan karakteristik pengalaman sebelumnya sebagian besar pernah dilakukan tindakan invasif sebanyak 18 responden (52,9%), berdasarkan karakteristik tindakan invasif sebagian besar dilakukan pemasangan infus sebanyak 21 responden (61,8%) dan berdasarkan karakteristik kehadiran orangtua secara keseluruhan didampingi orangtua sebanyak 34 responden (100%).
2. Skala nyeri pada kelompok intervensi setelah dilakukan tindakan invasif sebagian besar termasuk kategori nyeri sedang sebanyak 12 responden (70,6%).
3. Skala nyeri pada kelompok kontrol setelah dilakukan tindakan invasif sebagian besar termasuk kategori nyeri berat sebanyak 14 responden (82,4%).
4. Ada pengaruh pemberian madu terhadap respon nyeri setelah tindakan invasif dengan nilai *p value* 0,001 ($<0,05$).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Teoritis
Bagi ilmu keperawatan anak sebagai penanganan nyeri nonfarmakologi dapat dijadikan pertimbangan informasi terutama dalam permasalahan nyeri.
2. Praktis
 - a. Orangtua Anak Usia Sekolah di RSUD Wates

Bagi orangtua anak usia sekolah dapat memanfaatkan madu untuk mengatasi nyeri anak.

b. Perawat di RSUD Wates

Bagi perawat dapat menerapkan teknik nonfarmakologi dalam manajemen nyeri akibat tindakan invasif pada anak disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.

c. Mahasiswa Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Bagi mahasiswa Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta penelitian ini dapat dijadikan literatur di keperawatan anak dan dapat dijadikan tambahan informasi tentang manajemen nonfarmakologi bagi anak.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian selanjutnya dalam pemberian madu per *oral* terhadap respon nyeri anak, nyeri *post partum*, atau nyeri *sectio caesarea* dengan instrumen yang berbeda.