

GAMBARAN FAKTOR RESIKO IBU BERSALIN DENGAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSUD WONOSARI TAHUN 2012

INTISARI

Novi Dwi Nugraheni¹ . Tyasning Yuni Astuti SST,M.Kes²

Sri Subiyatun ,SsiT,M.Kes³

Novi Dwi Nugraheni¹

Tyasning Yuni Astuti²

Sri Subiyatun ,S,SiT,M,Kes³

Latar Belakang :Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan adalah Angka Kematian Ibu .Saat ini penyebab kematian ibu di Indonesia terbesar adalah karena perdarahan .Perdarahan yang paling besar menyebabkan kematian ibu adalah perdarahan postpartum .Perdarahan postpartum di RSUD Wonosari adalah sebesar 1,4 % dan RSUD Wonosari merupakan rumah sakit PONED yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan Penelitian :Untuk mendiskripsikan gambaran faktor resiko ibu bersalin dengan perdarahan postpartum di RSUD Wonosari berdasarkan umur , paritas , jenis persalinan , sosial ekonomi.

Metode Penelitian :Penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan crosssectional . Populasi semua ibu bersalin perdarahan postpartum di RSUD Jumlah sampel 105,tehnik sampling total sampling .

Hasil : Pada kejadian perdarahan postpartum didapatkan pada umur 20-35 th sebesar 85,7%, pada paritas banyak terjadi P 2- 3 sebesar 59% ,dan pada jenis persalinan banyak terjadi pada persalinan spontan sebesar 94,3%.

Kesimpulan : Perdarahan postpartum lebih banyak terjadi pada umur 20 -35 tahun,pada paritas P 2-3 dan pada jenis persalinan spontan .

Kata kunci perdarahan postpartum, faktor resiko,

DESCRIPTION OF MATERNITY MOTHER WITH RISK FACTORS IN PPH
HOSPITAL WONOSARI IN 2012

ABSTRACT

Novi Dwi Nugraheni¹ . Tyasning Yuni Astuti A.SST,M.Kes²

Sri Subiyatun ,SSiT,M.Kes³

Novi Dwi Nugraheni ¹

Tyasning Yuni Astuti A.S,ST.M,Kes²

Sri Subiyatun .S,SiT.M,Kes³

Background: One of the indicators to determine the health status is the maternal mortality rate. Currently causes of maternal death in Indonesia is due to the bleeding site. Bleeding most major causes of maternal deaths are postpartum hemorrhage. Wonosari Postpartum hemorrhage in hospitals amounted to 1.4% and hospital Wonosari an existing hospital PONEID in Gunungkidul.

Objective: To describe the picture of maternal risk factors with postpartum hemorrhage in hospitals Wonosari based on age, parity, type of birth, socio-economic

Methods: Quantitative descriptive study with cross sectional approach. Population of all women giving birth in hospitals PPH sample size 105, total sampling techniques sampling.

Results: On the occurrence of postpartum hemorrhage was found in the age of 20-35 years of 85.7%, a lot going on parity P 2-3 by 59%, and the type of labor prevalent in spontaneous labor was 94.3%

Conclusions: Postpartum hemorrhage is more common in the age of 20 -35 years, the parity P 2-3 and on the type of spontaneous labor.

Keywords postpartum hemorrhage, risk factors,