

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. U  
UMUR 29 TAHUN MULTIPARA DI PMB APPI AMMELIA  
BANTUL**

Sinta Eva Ningrum<sup>1</sup>, Alfie Ardiana Sari<sup>2</sup>

**RINGKASAN**

**Latar Belakang :** Di Indonesia insiden presentasi bokong terjadi sebanyak 3-4% dari seluruh kehamilan tunggal pada umur kehamilan cukup bulan ( $\geq 37$  minggu), insiden presentasi bokong semakin tinggi pada usia kehamilan yang lebih kecil yaitu 22-25% pada kehamilan  $< 28$  minggu, 7-15% pada kehamilan  $< 32$  minggu. risiko kejadian letak sungsang mempunyai presentase sebesar 14% pada ibu primipara, 24% pada ibu multipara 24%, dan 30% pada ibu grandemultipara.

**Tujuan :** Untuk melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan secara komprehensif dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir pada Ny U umur 29 tahun Multigravida sesuai standar pelayanan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan dan dokumentasi SOAP

**Hasil :** Hasil Asuhan kebidanan berkesinambungan komplementer yang telah diberikan pada Ny. U mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, neonatus dan KB masa nifas selesai, ditemukan perubahan yang positif pada Ny. U dan tidak ditemukan masalah yang terjadi pada Ny. U setelah diberikan asuhan komplementer.

**Kesimpulan :** Hasil yang di dapat dalam asuhan berkesinambungan berada dalam normal setelah dilakukan asuhan komplementer, masalah sudah teratasi, dan tidak ada penyulit dalam asuhan. Diharapkan dengan adanya asuhan berkesinambungan ini, kesehatan ibu dapat terpantau dan permasalahan yang ada dapat teratasi.

**Kata Kunci : Asuhan Berkesinambungan, Multigravida, Sungsang**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup>Dosen Pendidikan Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**CONTINUOUS OBSTETRIC CARE FOR MRS. U  
29 YEARS OLD MULTIPARA AT PMB APPI AMMELIA  
BANTUL**

Sinta Eva Ningrum<sup>1</sup>, Alfie Ardiana Sari<sup>2</sup>

**SUMMARY**

**Background:** In Indonesia, the incidence of buttocks presentation occurs as much as 3-4% of all single pregnancies at full term gestation ( $\geq 37$  weeks), the incidence of buttocks presentation is higher at a smaller gestational age, namely 22-25% in  $< 28$  weeks of pregnancy, 7-15% in  $< 32$  weeks of pregnancy. The risk of breech placement has a percentage of 14% in primipara mothers, 24% in multipara mothers 24%, and 30% in Grandemultipara's mother.

**Objective:** To carry out comprehensive continuous obstetric care from pregnancy, childbirth, postpartum, newborn to Mrs. U at the age of 29 years Multigravida in accordance with obstetric service standards with an approach to midwifery management and SOAP documentation

**Results:** The results of complementary continuous obstetric care that has been given to Mrs. U starting from pregnancy, childbirth, postpartum, neonate and postpartum family planning are completed, positive changes were found in Mrs. U and no problems were found in Mrs. U after being given complementary care.

**Conclusion:** The results obtained in continuous care are within normal after complementary care, the problem has been resolved, and there are no complications in the care. It is hoped that with this continuous care, the mother's health can be monitored and existing problems can be resolved.

**Keywords: Continuous Care, Multigravida, Breech**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup>Dosen Pendidikan Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta