

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY S UMUR 26
TAHUN PRIMIGRAVIDA DI PMB RITA JUWARININGSIH
TRIHARJO SLEMAN**

Dewi Sri Putri Wahabi¹, Ratih Kumoro Jati²

RINGKASAN

Latar Belakang: Peningkatan AKI dan AKB dikarenakan adanya gangguan, hal tersebut terjadi karena kurangnya penanganan pada masa kehamilan. D.I Yogyakarta tercatat memiliki 2 kasus pada tahun 2020 salah satunya yaitu pendarahan. Penyebab terjadinya resiko pendarahan yaitu KEK, KEK adalah kekurangan energi kronik/kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dapat diketahui dengan hasil pengukuran LILA/lingkar lengan atas, jika <23,5 maka seseorang tersebut mengalami KEK. Kejadian KEK akan beriringan dengan anemia, karena jika tidak tersedianya zat-zat gizi yang masuk, dapat mengganggu pembentukan sel darah merah di dalam tubuh. Hal tersebut akan menyebabkan ibu anemia, karena disaat masa kehamilan sel darah merah sedang dibutuhkan untuk perkembangan janin dalam perut ibu.

Tujuan: Mampu Menjalankan asuhan kebidanan secara berkesinambungan pada Ny S Umur 26 Tahun Primigravida secara Berkesinambungan di PMB Rita Juwariningsih.

Hasil: Setelah diberikan asuhan berkesinambungan pada Ny S didapatkan hasil yaitu normal.

Kesimpulan: Penulis telah melakukan asuhan berkesinambungan pada Ny S Umur 26 Tahun primigravida di PMB Rita Juwariningsih dimulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan KB.

Kata Kunci: Berkesinambungan, Primigravida

¹ Mahasiswa Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY S UMUR 26
TAHUN PRIMIGRAVIDA DI PMB RITA JUWARININGSIH
TRIHARJO SLEMAN**

Dewi Sri Putri Wahabi¹, Ratih Kumoro Jati²

ABSTRACT

Background: The increase in MMR and IMR is due to interference, this occurs due to lack of treatment during pregnancy. D.I Yogyakarta was recorded as having 2 cases in 2020, one of which was bleeding. The cause of the risk of bleeding is KEK, KEK is chronic energy deficiency/malnutrition over a long period of time. This can be determined by measuring LILA/upper arm circumference, if <23.5 then a person has KEK. The occurrence of KEK will go hand in hand with anemia, because if there are no nutritional substances coming in, it can interfere with the formation of red blood cells in the body. This will cause the mother to be anemic, because during pregnancy red blood cells are needed for the development of the fetus in the mother's stomach.

Objective: Able to carry out continuous midwifery care for Mrs. S, aged 26 years, Primigravida in a sustainable manner at PMB Rita Juwariningsih.

Results: After providing continuous care to Mrs S, the results were normal.

Conclusion: The author has provided continuous care for Mrs S, 26 year old primigravida at PMB Rita Juwariningsih starting from pregnancy, childbirth, postpartum, BBL and family planning.

Keywords: Continuously, Primigravida

¹ Mahasiswa Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta