

GAMBARAN ANGKA KEJADIAN *HYPEREMESIS GRAVIDARUM* DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL YOGYAKARTA

Kristina Eva¹, Endang Suprapti²

INTISARI

Latar Belakang: *Hyperemesis gravidarum* adalah perasaan mual muntah yang dialami lebih dari 10 kali, serta perasaan yang dialami oleh ibu pada awal masa kehamilannya sampai sekitar trimester 2 (umur kehamilan 20 minggu) secara berlebihan dalam waktu yang lama, pekerjaan sehari-hari terganggu dan keadaan ibu menjadi buruk. *Hyperemesis gravidarum* yang berlangsung lama dan tanpa penanganan lebih lanjut akan menyebabkan seorang ibu mengalami dehidrasi, kehilangan berat badan, turgor kulit kurang, dan diuresis kurang. Mual dan muntah membuat perasaan tidak enak, hal ini mungkin akan menyebabkan ibu akan malas untuk makan.

Tujuan : Di ketahuinya Gambaran Angka Kejadian *Hyperemesis Gravidarum* di RSUD Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta.

Metode Penelitian: Rancangan penelitian ini menggunakan *deskriptif kuantitatif* dengan pendekatan *retrospektif*. Populasi yang diambil yaitu semua ibu hamil *hyperemesis gravidarum* tahun 2013-2015 dengan jumlah 139 responden dan sampel yang digunakan yaitu *total sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis *univariat*.

Hasil : Sebagian besar ibu hamil yang mengalami *hyperemesis gravidarum* tingkat I dengan umur reproduksi sehat sebanyak 44,6%, *primigravida* sebanyak 33,8%, dan kehamilan trimester I sebanyak 46,8%.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami *hyperemesis gravidarum* tingkat I sebanyak 52,5%.

Kata Kunci: Umur, *Paritas*, dan Usia Kehamilan

¹Mahasiswa Program Studi Kebidanan (D-3) Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Program Studi Kebidanan (D-3) Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

THE DESCRIPTION OF THE NUMBER OF *HYPEREMESIS GRAVIDARUM* INSIDENCE IN RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL YOGYAKARTA

Kristina Eva¹, Endang Suprapti²

ABSTRACT

Background of Study: *Hyperemesis gravidarum* is a feeling of nausea and vomiting experienced more than 10 times. This feeling was experienced by mothers in early pregnancy until 2nd trimester (on 20 weeks of gestational period) excessively for a long time. This disturbs their daily activities and influences their condition. If *Hyperemesis gravidarum* was occurred in a long period without further treatment, it would cause dehydration, weight loss, less turgor skin and less diuresis. Nausea and vomiting create bad feelings, it might cause the mother will be reluctant to eat.

Objective of Study: This study aims to describe the number of *Hyperemesis Gravidarum* incidence in RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta.

Research Methods: The study used quantitative descriptive with retrospective approach. The population was 139 expectant mother who suffered *hyperemesis gravidarum* year 2013-2015. This study used total sampling technique. The data were analyzed using univariate analysis.

Results: The result showed that most of expectant mothers experienced *hyperemesis gravidarum* level I with total of 44.6% in healthy reproductive age, 33.8% in primigravida and 46.8% in first trimester of pregnancy.

Conclusion: Based on the results and discussion of this study it can be concluded that 52.5% of expectant mothers experienced *hyperemesis gravidarum* level I.

Keywords: Age, Paritas, Gestation Period

¹Diploma Midwifery Student of STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Diploma Midwifery Lecturer of STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta