

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Asuhan kehamilan yang telah di ambil Ny.S hamil dengan anemia ringan, kondisi kehamilan saat ini dalam keadaan sehat dan keluhan yang dialami masih normal. Hasil akhir kadar hemoglobin ibu meningkat yaitu 12 gr/dl sehingga tidak mengalami anemia lagi. Perlakuan yang diberikan kepada Ny. S sudah sesuai dengan standar pelayanan pelayanan kebidanan.
2. Pada persalinan Ny. S Pada fase aktif pertama hingga keempat, dukungan diberikan mulai dari pemantauan tanda vital, terapi komplementer, serta pemantauan kondisi fisik ibu dan janin. Di PMB Nurul Apri, Ny. S melahirkan secara normal melalui vagina pada tanggal 30 September 2024. Ibu mendapatkan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar asuhan kebidanan, dan digunakan 60 langkah APN untuk membantu persalinan.
3. Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir bayi cukup bulan, lahir secara normal, dan memiliki berat badan dalam kisaran normal. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar asuhan kebidanan pada bayi dengan keadaan normal.
4. Asuhan Masa nifas dilakukan sesuai standar asuhan kebidanan, Proses nifas Ny. S berjalan dengan lancar karena selama ini tidak ada kendala keluhan yang serius. Memberikan KIE tentang beberapa bentuk kontrasepsi yang mungkin digunakan oleh wanita menyusui dan kunjungan dilakukan sebanyak 4 kali.

C. Saran

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini disarankan untuk dijadikan bahan bacaan dipergustakaan yang nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi tambahan bagi mahasiswa kebidanan mengenai pentingnya mengkonsumsi tablet Fe bagi ibu hamil.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan dapat lebih memantau pemberian tablet Fe bagi ibu hamil terutama ibu dengan anemia.

3. Bagi Klien dan Keluarga

Diharapkan setelah pemberian tablet Fe secara rutin dapat diterapkan disaat klien atau ada anggota keluarga yang hamil, karena studi kasus ini menunjukkan adanya peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil Ketika mengkonsumsi tablet Fe secara rutin.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pemberian tablet Fe ini dengan menggunakan responden pendamping, atau menggunakan lebih dari satu responden. Hal ini agar dapat mengetahui intensitas terapi ini secara pasti terhadap kenaikan kadar hemoglobin.