

STUDI KASUS : ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN PADA NY. S DENGAN KETUBAN PECAH DINI DI PMB APPI AMMELIA, BANTUL

Maspupatun Nupus¹, Bdn. Ratih Kumorojati, S.SiT.,M.Kes²

Program Studi Profesi Kebidanan, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Email : maspupatunnupuss@gmail.com

RINGKASAN

Latar belakang : Ketuban pecah dini (KPD) atau ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) sering disebut dengan premature reapture of the membrane (PROM) didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya melahirkan. faktor penyebab kejadian ketuban pecah dini terbesar berada pada usia ibu, Usia kehamilan, Riwayat kehamilan & persalinan, paritas, Pendidikan, Aktivitas serta Pekerjaan. Dampak ketuban pecah dini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi neonatus meliputi prematuritas, respiratory distress syndrome, pendarahan intraventrikel, sepsis, hipoplasia paru, deformitas skeletal sehingga mengakibatkan gawat janin, sedangkan dampak ketuban pecah dini pada ibu dapat menyebabkan hubungan langsung dengan dunia luar dan ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi asenden dan infeksi intrapartal. Penanganan KPD terdapat pada kebijakan pemerintah dalam permenkes NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan yang terdapat pada area kompetensi ke-5 tentang Keterampilan Klinis Dalam Praktik Kebidanan

Tujuan : Untuk menganalisis faktor penyebab dan penanganan yang dapat dilakukan terhadap terjadinya KPD pada ibu bersalin. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Case Study). **Hasil :** Komplikasi Ketuban Pecah Dini (KPD) pada persalinan fase laten dapat terjadi salah satu faktornya yaitu paritas dan usia kehamilan. Ny. S dengan paritas multigravida dan usia kehamilan aterm dengan ketuban pecah dini. Untuk mendeteksi ketuban pecah dini dilakukan pemeriksaan tes nitrazin (lakmus). Penatalaksanaan yang diberikan kepada Ny. S yaitu dengan menganjurkan tiduran miring kanan dan miring kiri serta membatasi gerak klien, dan melakukan pemantauan serta asuhan. **Kesimpulan :** Ketuban Pecah Dini dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya paritas dan usia kehamilan. Penting untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pada terjadinya KPD pada ibu bersalin karena hal tersebut dapat menjadi upaya untuk melakukan tindakan preventif.

Kata kunci : *Ketuban Pecah Dini (KPD)*

Keterangan :

1. Mahasiswa program studi Profesi Kebidanan UNJAYA
2. Dosen program studi Profesi Kebidanan UNJAYA

**CASE STUDY: MIDWIFERY CARE FOR LABOR IN Mrs. S
WITH PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES AT PMB
APPI AMMELIA, BANTUL**

Maspupatun Nupus¹, Bdn . Ratih Kumorojati, S.SiT., M .Kes²

Midwifery Professional Study Program, General Achmad Yani University
Yogyakarta

Email: maspupatunnupuss@gmail.com

ABSTRACT

Background: Premature rupture of membranes (PROM) or premature rupture of membranes (PROM) is often referred to as the rupture of the amniotic membranes before the time of delivery. The biggest causative factors for premature rupture of membranes are maternal age, gestational age, pregnancy & childbirth history, parity, education, activity and occupation . The impact of premature rupture of membranes can cause various neonatal complications including prematurity, respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage, sepsis, pulmonary hypoplasia, skeletal deformities resulting in fetal distress, while the impact of premature rupture of membranes on the mother can cause direct contact with the outside world and the space in the uterus, thus facilitating ascending infections and intrapartum infections. Handling of PROM is contained in the government policy in the Minister of Health Regulation NUMBER HK.01.07 / MENKES / 320/2020 concerning Midwife Professional Standards contained in the 5th competency area concerning Clinical Skills in Midwifery Practice. **Objective:** To analyze the causative factors and treatments that can be carried out on the occurrence of PROM in mothers in labor. **Method:** The research method used is a qualitative approach with a case study method. **Results:** Complications of Premature Rupture of Membranes (PROM) in latent phase labor can occur due to one of the factors, namely parity and gestational age. Mrs. S with multigravida parity and term gestational age with premature rupture of membranes. To detect premature rupture of membranes, a nitrazine (litmus) test was performed. The management given to Mrs. S was by recommending lying on the right and left sides and limiting client movement, and conducting monitoring and care. **Conclusion:** Premature Rupture of Membranes can occur due to several factors including parity and gestational age. It is important to know the factors that cause PROM in women in labor because this can be an effort to take preventive measures.

Keywords: Premature Rupture of Membranes (PROM)

Information :

1. Students of the UNJAYA Midwifery Profession study program
2. Lecturer of UNJAYA Midwifery Profession study program