

THE FACTORS OF INFLUENCE ABORTUS IMMINENS AT RSUD WATES KULON PROGO YOGYAKARTA

Anindita Dea K.P¹, Atik Badi'ah², Nendhi Wahyunia Utami³

ABSTRACT

Background : Imminens abortion is any bleeding from the uterus before 20 weeks gestation, when the products of conception are still in the uterus without cervical dilation. The purpose of this research is to know the factors of influence abortus imminens consist of anemia, pharitas, and diabetes mellitus.

Method : This research using survey method with retrospective, in the RSUD Wates, Kulon progo. There was 42 respondents who suffer abortus imminens as samples of research and has been in instalation of RSUD Wates.

Result : This research found that 66,7% (n=28) respondents cause anemia, 23,8% (n=10) cause pharitas, and 31,0% (n=13) cause diabetes mellitus. The result of bivariate test shown there is significant relation between abortus iminens and the third of the factors. Abortus iminens with anemia (p=0,031), abortus iminens with pharitas (p=0,01), and abortus iminens with diabetes mellitus (p=0,014).

Conclusion : Conclusion of this research anemia, pharitas, and diabetes melitus are factors can influence of abortus iminens. So that is important to assess these factors, so the incidence of abortion can be reduced iminens.

Keywords: abortus imminens, anemia, pharitas, diabetes mellitus.

¹ Student of Diploma of Midwifery Study Programe Achmad Yani Yogyakarta School of Healts Sciences

² Lecture of STIKES A. Yani Yogyakarta

³ Lecture of STIKES A. Yani Yogyakarta

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ABORTUS IMINENS DI RSUD WATES KULONPROGO YOGYAKARTA

TAHUN 2010

Anindita Dea K.P¹, Atik Badi'ah², Nendhi Wahyunia Utami³

INTISARI

Latar Belakang : Abortus iminens adalah peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus sebelum kehamilan 20 minggu, saat hasil konsepsi masih dalam uterus tanpa adanya dilatasi servik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian abortus iminens yang terdiri dari anemia, pharitas dan riwayat DM.

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory dengan pendekatan retrospektif, yang dilaksanakan di RSUD Wates, Kulon progo. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 responden yang mengalami abortus iminens dirawat inap di RSUD Wates.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan terdapat 66,7% (n=28) responden memiliki faktor resiko anemia, 23,8% (n=10) karena pharitas, dan 31,0% (n=13) karena diabetes melitus. Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara abortus iminens dengan ketiga faktor tersebut. Abortus iminens dengan anemia ($p=0,031$), abortus iminens dengan pharitas ($p=0,01$), abortus iminens dengan riwayat DM ($0,014$).

Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah anemia, pharitas, dan riwayat DM merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya abortus iminens. Untuk itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor tersebut, sehingga kejadian abortus iminens dapat dikurangi.

Kata kunci: Abortus iminens, anemia, pharitas, riwayat DM

¹ Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan STIKES A. Yani Yogyakarta

² Dosen Poltekes Kemenkes Yogyakarta

³ Dosen STIKES A. Yani Yogyakarta