

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Usia ibu hamil yang mengalami preeklampsia terbanyak adalah usia reproduksi tidak sehat sebanyak 17 responden (58.6%) dan usia reproduksi sehat sebanyak 12 responden (41,4%).
2. Ibu hamil yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 18 responden (62.1%) dan preeklampsia ringan sebanyak 11 responden (37,9%)
3. Ada hubungan antara usia ibu hamil dengan derajat preeklampsia. Hasil uji *Fisher's Exact Test* didapatkan nilai p sebesar 0.001 dan koefisien kontingensi (C) sebesar 0.540 dengan keeratan hubungan sedang.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)

Diharapkan agar lebih menekankan KIE tentang tanda bahaya kehamilan terutama preeklampsia karena preeklampsia dapat dideteksi secara dini dan dapat juga terjadi secara tiba-tiba.

2. Bagi Tenaga Rekam Medik

Diharapkan agar lebih memperhatikan kelengkapan data rekam medik terutama data tentang ibu hamil yang mengalami preeklampsia.

3. Bagi Institusi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu tambahan pengetahuan dan masukan serta dapat dijadikan referensi dipergustakaan STIKES A YANI.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan derajat preeklampsia.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA