

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PERAWATAN PAYUDARA DENGAN KEJADIAN BENDUNGAN ASI PADA IBU NIFAS DI PUSKESMAS TEMPEL II, SLEMAN, YOGYAKARTA.

INTISARI

Miftakhul Latifah ¹, Dewi Rokhanawati ², Endang Suprpti ³

Latar Belakang : Kejadian bendungan ASI dapat dipengaruhi oleh tidak disusu secara adekuat, posisi menyusui yang salah dan menyusui dengan dijadwal, puting susu datar atau terbenam, puting susu yang tidak bersih, dan bra yang terlalu ketat. Beberapa keadaan tersebut dipengaruhi oleh perilaku ibu yang salah dalam melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan dan setelah melahirkan.

Tujuan : Diketuinya hubungan tingkat pengetahuan tentang perawatan payudara dengan kejadian bendungan ASI pada ibu nifas di Puskesmas Tempel II Sleman Yogyakarta.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian *analitik observasional*, pengambilan sampel menggunakan *metode accidental sampling*. analisis data menggunakan teknik *analisa univariat* dan *analisa bivariat*, *analisa bivariat* menggunakan teknik *analisis Korelasi Chi Square*.

Hasil : Responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 19 orang (51,4%) dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 18 orang (48,6%) sedangkan yang mengalami kejadian bendungan ASI sebanyak 16 orang (43,2%) dan yang tidak mengalami bendungan ASI sebanyak 21 orang (56,8%)

Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang perawatan payudara dengan kejadian Bendungan ASI pada ibu nifas di Puskesmas Tempel II Sleman Yogyakarta Tahun 2012.

Saran : Bagi ibu nifas dapat meningkatkan pengetahuannya dalam perawatan payudara dan dapat melakukan perawatan payudara sendiri serta memberikan ASI yang cukup pada bayinya agar dapat menurunkan angka kejadian bendungan ASI

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Perawatan Payudara, Kejadian Bendungan ASI

Kepustakaan : 27 buku (2002-2010), 2 Jurnal (2009-2011), 4 KTI (2009-2011), 2 Artikel (2007-2012).

Halaman : i---xvi, 1---61

¹ Mahasiswa Diploma III Kebidanan STIKES A.Yani Yogyakarta

² Dosen STIKES A.Yani Yogyakarta

³ Dosen STIKES A.Yani Yogyakarta

**RELATIONSHIP THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT CARE
BREAST IN THE EVENT DAM ASI IN MOTHER POSTPARTUM IN
PUSKESMAS TEMPEL II, SLEMAN, YOGYAKARTA.**

ABSTRACT

Miftakhul Latifah¹, David Rokhanawati ²,Endang Suprpti ³

Background: The incidence of ASI can be affected by the dam feeding is adequately , position feeding and feeding with scheduled, flat or goes down the nipple, the nipple is not clean, and the bra is too tight. Some circumstances are influenced by maternal behavior was wrong in doing breast care during pregnancy and after childbirth.

Purpose: Knowledgeable relationship the level of knowledge about care breast in the event dam ASI in mother postpartum in Puskesmas Tempel II, Sleman, Yogyakarta

Methods: This study was an study analytic observational, sampling using method accidental sampling. Analysis data using techniques analysis univariate and analysis bivariate, analysis bivariate using techniques analysis correlation Chi Square.

Results: Respondents who have a good level of knowledge of as many as 19 people (51,4%) and who have less knowledge level as many as 18 people (48,6%) whereas the incidence of dam ASI have as many as 16 people (43,2%) and are not ASI has a dam 21 persons (56,8%)

Conclusion: There is a relationship between the level of knowledge about care breast in the event dam ASI in mother postpartum in Puskesmas Tempel II, Sleman, Yogyakarta.

Suggestion: To be consistent with knowledge of breast care and breast care alone can perform as well as provide enough ASI to her baby in order to reduce the incidence of dam ASI.

Keywords: Level of Knowledge, Breast Care, Genesis dam ASI.

Bibliography: 27 books (2002-2010), 2 Journal (2009-2011), 4 KTI (2009-2011),article 2 (2007-2012).

Page: i --- xvi, 1 --- 61

¹ Students Diploma III Midwifery STIKES A. Yani Yogyakarta

² Lecturer STIKES A. Yani Yogyakarta

³Lecturer STIKES A. Yani Yogyakarta