

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG PERILAKU SEKSUAL KEHAMILAN DI BPS WATI SUBAGYA PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA

Hendaru Galuh Kinasih¹, Atik Badi'ah², Nur Rahmawati Sholihah³

INTISARI

Latar Belakang : Di Indonesia melakukan hubungan seksual pada trimester I sebesar 75%, trimester II sebesar 26%, trimester III sebesar 8% dan sebagian besar merasa tidak nyaman dengan perut membesar, takut melukai janin dan cemas.

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang perilaku seksual kehamilan di BPS Wati Subagya Prambanan, Sleman, Yogyakarta.

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kuantitatif* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester III dengan umur kehamilan 28-40 minggu. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *total sampling*. Analisis data menggunakan *distribusi frekuensi*.

Hasil : Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang baik sebesar 54,3%, dan sebesar 57,1% responden melakukan aktivitas seksual sebanyak satu kali setiap minggu.

Kesimpulan: Diketahui sebagian besar responden di BPS Wati Subagya dengan persentase 54,3% mempunyai pengetahuan yang baik tentang perilaku seksual kehamilan dan 57,1% melakukan aktivitas seksual sebanyak satu kali setiap minggu.

Kata kunci : Tingkat Pengetahuan, Perilaku seksual kehamilan
Kepustakaan : 11 Buku, 1 Thesis, 6 KTI, 8 Internet
Halaman : i-xiv, Isi: 1-39

¹ Mahasiswa Kebidanan STIKES A Yani

² Dosen POLTEKES Yogyakarta

³ Dosen STIKES A Yani Yogyakarta

**DESCRIPTION OF THE KNOWLEDGE OF PREGNANT WOMEN III
TRIMESTER PREGNANCY IN SEXUAL BEHAVIOR BPS WATI
SUBAGYA PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA**

Hendaru Galuh Kinasih¹, Atik Badi'ah², Nur Rahmawati Sholihah.³

ABSTRACT

Background: In Indonesia had sexual intercourse in the first trimester by 75%, 26% second trimester, third trimester 8% and feel sexual desire decreases with reason to feel uncomfortable with abdominal bloating, anxiety and fear of injuring the fetus.

Objectives: To determine how the image of the third trimester pregnant women knowledge about sexual behavior in the BPS Wati pregnancy Subagya Prambanan, Sleman, Yogyakarta.

Research Methods: The study used a descriptive quantitative method with cross sectional approach. The population in this study is the third trimester pregnant women with gestational age 28-40 weeks. The sampling method is to use total sampling. This analysis is used a frequency distribution.

Results: From the test results obtained the majority of respondents had good knowledge with percentage 54.3%, dan the majority 57.1% of respondent the percentage of sexual activity as much as once a week.

Conclusion: Given the majority of respondents in the BPS Wati Subagya with percentage 54.3% had good knowledge about sexual behavior and 57.1% pregnancy sexual activity one time each week

Key words : Knowledge Exchange, Pregnancy Sexual Behavior

Bibliography : 11 Book, 1 Thesis, 6 KTI, 8 Internet

Pages : i-xiv, Contents: 1-39

1 Students of midwifery STIKES A Yani

2 Lecturer I of POLTEKES Yogyakarta

3 Lecturer II of STIKES A Yani Yogyakarta