

HUBUNGAN *PEER PRESSURE* DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA MADYA USIA 13-15 TAHUN DI SMP MUHAMMADIYAH 3 MLATI

Brian ¹ , Ferianto ²

INTISARI

Latar Belakang: *World Health Organization* (WHO) menyatakan jumlah perokok diseluruh dunia mencapai 22,3% dari total populasi diseluruh dunia. Demikian pula prevalensi perokok pada remaja usia 10-18 tahun mengalami peningkatan. Salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku merokok pada remaja adalah *peer pressure*. Faktor *peer pressure* dapat mempengaruhi perilaku pada remaja yang salah satunya adalah perilaku merokok.

Tujuan: Mengetahui hubungan *peer pressure* dengan perilaku merokok pada remaja madya usia 13-15 tahun di SMP Muhammadiyah 3 Mlati.

Metode: Metode penelitian yang digunakan *deskriptif analitic* korelasi dengan desain *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi uisa 13-15 tahun sebanyak 78 siswa dengan metode pengambilan sampling menggunakan *total sampling*. Analisis data bivariat menggunakan uji *Somers'd*.

Hasil: Sebagian besar responden mengalami *peer pressure* berat sebesar 57,4%. Perilaku merokok pada remaja sebagian besar adalah ringan sebanyak 55,3% dengan nilai *p value* 0,034 ($<0,05$) dan nilai *r* -0,266.

Kesimpulan: Adanya hubungan yang signifikan antara *peer pressure* dengan perilaku merokok pada remaja madya usia 13-15 tahun di SMP Muhammadiyah 3 Mlati dengan tingkat keeratan hubungan lemah.

Kata Kunci: Remaja, *Peer Pressure*, Perilaku Merokok

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Pembimbing Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**THE CORRELATION PEER PRESSURE AND SMOKING BEHAVIOR
IN MIDDLE ADOLESCENTS AGED 13-15 YEARS IN SMP
MUHAMMADIYAH 3 MLATI**

Brian ¹ , Ferianto ²

ABSTRACT

Background: The World Health Organization (WHO) states that the number of smokers worldwide has reached 22.3% of the total population. Likewise, the prevalence of smokers in adolescents aged 10-18 years has increased. One of the factors causing smoking behavior in adolescents is peer pressure. Peer pressure factors can influence behavior in adolescents, one of which is smoking behavior.

Objective: Knowing the correlation between peer pressure and smoking behavior in middle adolescents aged 13-15 years at SMP Muhammadiyah 3 Mlati.

Method: The research method used is a descriptive-analytic correlation with a cross-sectional design. The population in this study was 78 students aged 13-15 years with a sampling method using total sampling. Bivariate data analysis using the Somers'd test.

Results: Most respondents experienced severe peer pressure of 57.4%. Smoking behavior in adolescents was mostly light at 55.3% with a p-value of 0.034 (<0.05) and an r-value of -0.266.

Conclusion: There is a significant correlation between peer pressure and smoking behavior in middle-aged adolescents aged 13-15 years at SMP Muhammadiyah 3 Mlati with a weak level of relationship.

Keywords: Adolescents, Peer Pressure, Smoking Behavior

1 Student of Nursing (S1), Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

2 Lecturer of Nursing (S1), Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta