

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “hubungan factor resiko terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil” dapat disimpulkan bahwa :

- 1 Diketahui hubungan factor resiko umur terhadap kejadian preeklampsia, Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,003$ atau $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dengan kejadian preeklampsia.
- 2 Diketahui hubungan factor resiko paritas terhadap kejadian preeklampsia, Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,002$ atau $p \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dengan kejadian preeklampsia
- 3 Diketahui hubungan factor resiko indeks masa tubuh terhadap kejadian preeklampsia, hasil uji statistik diperoleh IMT ibu sebelum hamil dengan nilai $p = 0,000$ atau $p \leq 0,05$ dan IMT ibu saat hamil dengan nilai $p = 0,000$ atau $p \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan ada hubungan bermakna antara IMT ibu sebelum dan saat hamil dengan kejadian preeklampsia.

B. Saran

1. Bagi Ibu Hamil

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya ibu hamil, tentang kejadian preeklampsia.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Sebagai bahan penelitian atau bahan kajian kesehatan tentang preeklampsia pada ibu hamil di masyarakat.

3. Bagi Universitas Jenderal Achmad Yani

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan referensi ilmu yang berguna, sebagai bahan pembelajaran dan memperkaya ilmu pengetahuan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA