

HUBUNGAN PERILAKU ORANG TUA DALAM PENANGANAN ORAL HIDRASI DENGAN KEJADIAN DEHIDRASI PADA ANAK DENGAN DIARE DI RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO

INTISARI

Fera Dwi Purwanti¹, Atik Badi'ah², Retno Sumiyarini³

Latar Belakang: Banyak angka kematian pada diare disebabkan karena dehidrasi. Sedangkan pengobatan utama diare itu sendiri adalah mengatasi terjadinya dehidrasi tersebut. Terapi rehidrasi sangat efektif untuk menurunkan angka kematian diare akibat dehidrasi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status dehidrasi anak diare adalah perilaku orang tua dalam penanganan *oral hidrasi*. Perilaku menanggulangi dehidrasi pada anaknya yang menderita diare adalah dengan memberikan cairan, akan tetapi dengan jumlah, frekuensi dan jenis cairan yang belum sesuai dengan cairan yang dibutuhkan tubuh.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan perilaku orang tua dalam penanganan oral hidrasi dengan kejadian dehidrasi pada anak dengan diare di RSUD Saras Husada Purworejo.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitik* menggunakan *rancangan cross sectional*. Teknik sampel yang digunakan dengan cara *Non-probability Sampling* menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Pengumpulan data dengan kuesioner. Jumlah sampel adalah 24 orang tua anak yang menderita diare. Uji analisa data yang digunakan adalah *Kendal Tau*.

Hasil: Perilaku orang tua dalam penanganan *oral hidrasi* untuk anaknya yang menderita diare mayoritas kurang yaitu sebanyak 58,3%. Status dehidrasi anak diare sebagian besar diare dengan dehidrasi ringan/ sedang yaitu sebanyak 45,8%. Hasil analisa *Kendall Tau* sebesar -0,443 dengan taraf signifikansi 0,020. Hasil penelitian menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 ($0,020 < 0,05$) yang berarti terdapat hubungan antara perilaku orang tua dalam penanganan *oral hidrasi* dengan kejadian dehidrasi pada anak dengan diare di RSUD Saras Husada Purworejo.

Kesimpulan: Ada hubungan antara perilaku orang tua dalam penanganan *oral hidrasi* dengan kejadian dehidrasi pada anak dengan diare di RSUD Saras Husada Purworejo.

*Kata kunci: Perilaku *oral hidrasi* orang tua, Dehidrasi, Status dehidrasi.

¹Mahasiswa S1 Keperawatan STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen POLTEKES Depkes Yogyakarta

³Dosen STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

RELATIONSHIP BEHAVIOR PARENTS IN HANDLING WITH ORAL HYDRATION WITH EVENTS DEHYDRATION IN CHILDREN WITH DIARRHEA IN RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO

ABSTRACT

Fera Dwi Purwanti ¹, Atik Badi'ah ², Retno Sumiyarini ³

Background: Many deaths due to diarrheal dehydration. While the primary treatment of diarrhea it self is overcome the dehydration. Rehydration therapy is highly effective for reducing mortality due to diarrheal dehydration. One of the factors that may affect the status of the child's diarrhea is oral rehydration management of the parents. In children with diarrhea is to provide a liquid, but with the amount, frequency and type of fluid that is not in accordance with the fluids the body needs.

Research Objectives: To determine the relationship behavior parents in handling with oral hydration with events dehydration in children with diarrhea in RSUD Saras Husada Purworejo.

Research Methods: This research uses method descriptive analytical using design cross sectional. Engineering samples are used by non-probability sampling using technique Accidental Sampling. Data collection by questionnaire. The number of samples is 24 parents of children with diarrhea. Analysis of test data used was the Kendall Tau.

Results: The behavior of parents in the treatment of oral hydration of children suffering from diarrhea for lack of a majority of as many as 58,3%. Dehydration status of child diarrhea with dehydration diarrhea mostly mild / moderate as many as 45,8%. Results analysis Kendall Tau of -0,443 with level a significance of 0,020. The results showed a p-value less than 0,05 ($0,020 < 0,05$) which means there is a relationship between behavior parents' in the treatment of oral hydration with the incidence of dehydration in children with diarrhea in RSUD Saras Husada Purworejo.

Conclusion: There is a relationship between behavior parents' in the treatment of oral hydration with the incidence of dehydration in children with diarrhea in RSUD Saras Husada Purworejo.

Keywords: The behavior oral hydration of parents, dehydration, status dehydration.

¹Student S1 Nursing STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Lecturer POLTEKES Department of Health Yogyakarta

³Lecturer STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta