

**PERBEDAAN TINGKAT NYERI PADA IBU POST PARTUM YANG MENGALAMI
RUPTUR SPONTAN DENGAN YANG DILAKUKAN EPISIOTOMI
DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Keperawatan
STIKES A.YANI Yogyakarta



Disusun oleh :

RETNA KUMALA DEWI
3208018

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA**

2012

**PERBEDAAN TINGKAT NYERI PADA IBU POST PARTUM YANG MENGALAMI
RUPTUR SPONTAN DENGAN YANG DILAKUKAN EPISIOTOMI
DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RETNA KUMALA DEWI


NPM: 3208018

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Diterima Sebagai Salah
Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Keperawatan di Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal: 31 - 8 - 2012

Menyetujui :

Penguji,




Retno Mawarti S.Pd., M.Kes
NIP: 140107693

Pembimbing I,



Sri Sumaryani, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Mat
NIP: 173-046


Pembimbing II,



Yanita Tri, S.S.Kep., Ns
NIDN: 05-0501-8201

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan
STIKES A. Yani Yogyakarta



Dwi Susanti, S.Kep., Ns
NIDN: 05-3005-8401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Agustus 2012

Retna Kumala Dewi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : Perbedaan Tingkat Nyeri Pada Ibu Post Partum Yang Mengalami Ruptur Spontan Dengan Yang Dilakukan Episiotomi Di RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Skripsi ini telah dapat diselesaikan, atas bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. dr. I. Edy Purwoko, Sp.B. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Dwi Susanti, S.Kep., Ns. selaku Ketua Prodi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Retno Mawarti, S.Pd.,M.Kes. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran yang berguna bagi penulis.
4. Sri Sumaryani, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Mat. selaku Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan pendapat yang berguna.
5. Yanita Tri Setyaningsih, S.Kep., Ns. selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan pendapat yang berguna.
6. Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul yang telah mengizinkan melakukan penelitian di RSUD Panembahan Senopati Bantul.
7. Ibu Post Partum dengan Ruptur spontan dan dengan episiotomy, perawat, bidan, dan karyawan RSUD Panembahan Senopati Bantul yang telah sabar dan membantu peneliti dalam penelitian ini.
8. Ibu dan Ayah, mas Gun dan mbak Listy, dek Candra dan dek Alya, Eyang dan Ndru yang memberikan limpahan cinta, doa serta semangat.
9. Semua teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani khususnya mahasiswa keperawatan angkatan 2008 yang telah membantu terselesainya Skripsi ini.
10. Ibu-Ibu Post Partum yang telah bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semuanya, sebagai imbalan atas segala amal kebaikan dan bantuannya. Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi semua.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 15
A. Nyeri	15
B. Ruptur Perineum	26
C. Episiotomi	30
D. Kerangka Teori	33
E. Kerangka Konsep	34
F. Hipotesis Penelitian	35
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Rancangan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Definisi Operasional	38
E. Variabel penelitian	39
F. Alat dan Metode Pengumpulan Data	41
G. Analisa dan Model Statistik	43
H. Pelaksanaan Penelitian	45
I. Etika Penelitian	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 48
A. Hasil	48
B. Pembahasan	53

C. Keterbatasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Definisi Operasional Variabel Penelitian..... 39
Tabel 2	Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Post Partum Di RSUD Panembahan Senopati Bantul..... 49
Tabel 3	Distribusi Frekuensi Ibu Post Partum Yang Mengalami Ruptur Spontan Di RSUD Panembahan Senopati Bantul..... 51
Tabel 4	Hasil Pengukuran Tingkat Nyeri Ibu Post Partum Yang Mengalami Rupture Spontan..... 51
Tabel 5	Distribusi Frekuensi Ibu Post Partum Yang Dilakukan Episiotomi Di RSUD Panembahan Senopati Bantul..... 52
Tabel 6	Hasil Pengukuran Tingkat Nyeri Ibu Post Partum Yang Dilakukan Episiotomi..... 52
Tabel 7	Hasil Uji Mann Whitney U perbedaan Tingkat Nyeri Ibu Yang Mengalami Rupture Spontan Dengan Yang Dilakukan Episiotomi Di RSUD Panembahan Senopati Bantul 53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skala Nyeri deskriptif	23
Gambar 2 Skala identitas Nyeri Numerik	24
Gambar 3 Skala Analog Visual	24
Gambar 4 Skala Nyeri menurut Bourbanis	24
Gambar 5 Skala Nyeri menurut Ekspresi Wajah	25
Gambar 6 Kerangka Teori	33
Gambar 7 Kerangka Konsep	34

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal Penelitian
- Lampiran 2. Surat Ijin Studi Pendahuluan dan Penelitian
- Lampiran 3. Surat Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 4. *Inform Consent*
- Lampiran 5. Lembar Biodata Ibu
- Lampiran 6. Skema Prosedur Penelitian
- Lampiran 7. Alat Penelitian (Pengukuran Skala Nyeri menurut Baurbanis)
- Lampiran 8. Lembar Instrumen Tingkat Nyeri Untuk Ibu Ruptur Spontan
- Lampiran 9. Lembar Instrumen Tingkat Nyeri Untuk Ibu Episiotomi
- Lampiran 10. Lembar Konsultasi
- Lampiran 11. Rekapitulasi Jawaban Responden
- Lampiran 12. Hasil SPSS

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

PERBEDAAN TINGKAT NYERI PADA IBU POST PARTUM YANG MENGALAMI RUPTUR SPONTAN DENGAN YANG DILAKUKAN EPISIOTOMI DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

DIFFERENCES PAIN AT SPONTANEOUS RUPTURE POST PARTUM WITH EPISIOTOMY POST PARTUM IN RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

Retna Kumala Dewi¹, Sri Sumaryani², Yanita Tri Setyaningsih³

ABSTRACT

Background: Spontaneous rupture of perineum and episiotomy can provide a sense of discomfort (pain) in women after child birth (Prawirohardjo, 2004). Preliminary studies in RSUD Panembahan Senopati Bantul show the number of women who experienced spontaneous rupture of 130 give birth while the episiotomy is performed as many as 144 give birth. The level of pain experienced post partum mothers with spontaneous rupture in women who had episiotomy is different.

Objective: Known effectiveness of the pain in post partum who experience spontaneous rupture with episiotomy performed at RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Method: This methods in this study was a comparative with crossectional approach. Sampel were taken with a purposive sampling that is 32 post partum who experienced spontaneous rupture and episiotomy wound in RSUD Panembahan Senopati Bantul. The research instrument is observation result were alakyzed by Mann Whitney U.

Result: The level of pain post partum women who experienced spontaneous rupture in RSUD Panembahan Senopati Bantul mostly mild to moderate pain respectively by 7 people (43,8%). The level of pain post partum who do most of the pain is episiotomy as many as 12 people (75%). Mann Whitney U test result obtained p-value $0,029 < 0,05$.

Conclusion: There is difference in the level of pain post partum who experienced spontaneous rupture with episiotomy performed.

Suggestion: Researchers further exercise control over the factors that affect the level of pain such as parity, maternal postpartum experience of pain, level of maternal care on pain, anxiety and coping patterns.

Keywords : Spontaneous Rupture pain level, Episiotomy pain level

¹ Mahasiswa PSIK STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Dosen PSIK STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta