

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menerima hipotesis yaitu terdapat hubungan antara Bayi Berat Lahir Rendah dengan kejadian Asfiksia Neonatorum ditunjukkan dengan hasil uji *Kendall's Tau* dengan nilai $p = 0.013 < 0.05$ dengan keeratan hubungan sangat rendah yaitu 0,131.

B. Saran

1. Bagi Profesi Perawat

- a. Perawat ruang Perinatologi RSUD wates hendaknya melakukan promosi kesehatan mengenai pentingnya pemeriksaan ANC bagi ibu hamil sehingga ibu dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya BBLR dengan cara : menyarankan kepada keluarga agar meningkatkan status ekonomi, melakukan pengawasan kepada ibu hamil dengan seksama dan teratur, menganjurkan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi, agar bayi tidak mengalami kejadian asfiksia.
- b. Perlu dilakukan pencatatan yang lebih akurat dan lengkap mengingat pentingnya pendokumentasian

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan data primer sehingga hasil yang didapatkan akan lebih baik.
- b. Peneliti yang akan datang hendaknya mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan pengontrolan dan pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum, seperti: malpresentasi, partus lama, persalinan yang sulit dan traumatik, mekonium dalam ketuban, ketuban pecah dini, induksi oksitosin, dan prolaps tali pusat.