

# GAMBARAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) PADA KEHAMILAN CUKUP BULAN DI RSUD WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013

## INTISARI

Irena Setya Natania<sup>1</sup>, Ratna Prahesti<sup>2</sup>

**Latar Belakang:** BBLR adalah bayi baru lahir yang berat saat lahir kurang dari 2500 gram memiliki risiko kematian yang lebih tinggi daripada bayi yang lahir normal. Bayi berat lahir rendah (BBLR) dapat terjadi pada kehamilan cukup bulan usia kehamilan 37-42 minggu karena pertumbuhan janin yang terganggu yaitu berat lahir bayi tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Faktor lain yang menyebabkan yaitu usia ibu saat melahirkan dan riwayat penyakit yang dialami ibu.

**Tujuan:** Mengetahui gambaran kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) pada kehamilan cukup bulan di RSUD Wates Kulon Progo tahun 2013.

**Metode:** Jenis penelitian adalah diskriptif pendekatan *retrospektif* dengan metode *total sampling*. Sampel yang digunakan 100 sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan.

**Hasil:** BBLR pada kehamilan cukup bulan terdapat 100 ibu berdasarkan karakteristik yaitu umur ibu terbanyak pada umur 20-35 sebanyak 69 (69%), umur >35 tahun sebanyak 23 (23%), dan <20 tahun sebanyak 8 (8%). Riwayat penyakit terbanyak pada ibu yang tidak memiliki penyakit sebanyak (89%), dan ibu yang memiliki penyakit sebanyak 11 (11%).

**Kesimpulan:** Sebagian besar ibu melahirkan bayi berat lahir rendah pada usia reproduksi sehat 20-35 tahun, kemudian usia <8 tahun dan >35 tahun dan sebagian besar ibu melahirkan bayi berat lahir rendah tidak memiliki penyakit.

**Kata Kunci:** BBLR, cukup bulan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa DIII Kebidanan STIKES A Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen STIKES A Yani Yogyakarta

## **Description of Incident Low Birth Weight Babies (LBW) in pregnancy is aterm in hospitals Wates Kulon Progo 2013**

### **ABSTRACT**

*Irena Setya Natania<sup>1</sup>, Ratna Prahesti<sup>2</sup>*

**Background:** LBW is a newborn baby's birth weight less than 2500 grams so it has a higher risk of death. LBW Can accure at pregnancy aterm that is gestational age 37-42 weeks due to the growth of the fetus is impaired so the baby's birth weight does not correspond to the age of her pregnancy. Another factor which causes the namely the age of mothers during childbirth and illness experienced by the mother's history

**Objective:** Knowing the baby incident description low birth weight (LBW) in pregnancy aterm in hospitals Wates Kulon Progo by 2013.

**Method:** This type of research is diskriptive by the method of retropektif approach of total sampling. The sampel used is 100 samples based on the criteria.

**Result:** LBW in pregnancy aterm is 100 based on the characteristics of the age most mothers at age 20-35 total 69 (69%), age > 35 years by as much as 23 (23%), and < 20 years as many as 8 (8%), Most illness history mother who doesn't have as much disease (89%), and mothers who have as much disease 11 (11%).

**Conclusion:** Most mother give birth to babies of low birth weight on a healthy reproduktive age 20-35 years old, then the age <20 years and >35 years and the majority of mother give birth to low birth weight babies don't have the disease.

**Keywords:** LBW, aterm

---

<sup>1</sup>High student of D-III Midwife STIKES A. Yani Yogyakarta

<sup>2</sup>Lecturer of STIKES A. Yani Yogyakarta